# Clanis Centro Diagnostico - Catalogo Esami Laboratorio

Aggiornato al 19/09/2025

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET | 17 CHETOSTEROIDI | N | € 16,50 | LuMaMeGiVe | 9 | | Cromatografico | mg/24h | 90.01.3 | Adulti: 12 - 13 anni 4,5 - 8,0<br>13 - 14 anni 5,0 - 9,0<br>15 - 17 anni 10,7 - 15,3<br>18 anni 12,0 - 17,0<br>19 anni 13,2 - 17,9<br>20 - 25 anni 14,0 - 18,8<br>25 - 40 anni<br>Bambini: 0 - 6 anni 0,1 - 2,3<br>6 - 10 anni 1,1 - 5,6<br>10 - 11 anni 4,0 - 7,0<br>11 - 12 anni 4,5 - 7,5<br>12 - 13 anni 4,5 - 8,0<br>13 - 14 anni 5,0 - 9,0 |
| P17 | 17-OH PROGESTERONE | S | € 11,70 | LuMe | 7 | 112 | EIA | ng/mL | 90.01.2 | Uomo: Adulti 0,20 - 2,30<br>Prepuberale 0,20 - 0,90<br>Donna: Fase follicolare 0,20 - 1,30<br>Fase luteale 1,00 - 4,50<br>Postmenopausa 0,20 - 0,90<br>Gravidanza 2,00 - 15,00<br>Bambini: 0,20 - 0,90 |
| ESA | 2,5 ESANDIONE (Fine T.) | N | € 26,00 | LuMe | 12 | | GC FID | mg/g creat | | Adulti: < 0,5 per soggetti non esposti.<br>< 5,0 per soggetti esposti (BEI) |
| CYP21 | 21 IDROSSILASI PRINCIPALI MUT | N | € 350,00 | MaGi | 17 | | PCR | | | Negativo<br>Ricerca delle principali mutazioni del gene CYP21B. Mutazioni ricercate: P30L, A/C655G, N172I, V281L, Q318X, W356R. Test eseguito mediante amplificazione genica e successiva sequenza automatizzata. La sindrome SAG è una condizione autosomica r |
| SRD5A | 5 ALFA-REDUTTASI DEFICIT | N | € 320,00 | LuMaMeGiVe | 18 | | PCR | | | Negativo |
| 706 | A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA | N | € 20,00 | | 10 | | Enzimatico Colorimetrico | | | |
| 21BID | Ab ANTI 21 IDROSSILASI | N | € 100,00 | LuMaMeGiVe | 33 | | RIA | U/mL | | < 10,0 |
| 1635 | Ab ANTI ACQUAPORINA IgG | N | € 150,00 | LuMeVe | 13 | | IFI | Titolo | | < 1:10 |
| ADENG | Ab ANTI ADENOVIRUS IgG | N | € 28,00 | LuMaMeGiVe | 8 | | EIA | AU/mL | 91.12.3 | Negativo < 8,5<br>Borderline 8,5 - 11,5<br>Positivo > 11,5 |
| ADENM | Ab ANTI ADENOVIRUS IgM | N | € 28,00 | LuMaMeGiVe | 8 | | EIA | AU/mL | 91.12.3 | Negativo < 8,5<br>Borderline 8,5 - 11,5<br>Positivo > 11,5 |
| TMS | Ab ANTI Ag MICROSOMIALI (TMS) | N | € 8,50 | LuMaMeGi | 4 | 127 | RIA | IU/mL | 90.51.4 | Fino a 100 |
| ENA | Ab ANTI Ag NUCLEARI ESTRAIBILI | N | € 8,00 | LuMaMeGiVeSa | 9 | 67 | EIA | | 90.47.3 | |
| 1244 | Ab Anti Ag ONCO-NEURONALI (6) | N | € 180,00 | LuMaMeGi | 18 | | | | | |
| 13214 | Ab ANTI AMOEBA | N | € 80,00 | LuMaMeGi | 15 | | IFA | Titolo | | < 1:20 |
| ANNES | Ab Anti Annessina V IgG | N | € 60,00 | LuMaMeGi | 15 | | Elettroimmunodiffusione | U/L | | Negativo |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8880 | Ab ANTI ARBOVIRUS (TBE) IgG | N | € 56,00 | LuMaMeGi | 10 | | Emoagglut. | Titolo | | < 1:20 |
| 8882 | Ab ANTI ARBOVIRUS (TBE) IgM | N | € 56,00 | LuMaMeGi | 10 | | Emoagglut. | Titolo | | < 1:20 |
| 582 | Ab ANTI ASCARIS | N | € 30,00 | LuMaMeGi | 17 | | EIA | U/mL | | 0,0 - 8,5 |
| BARHG | Ab ANTI BARTONELLA HENS. IgG | N | € 17,10 | LuMe | 12 | | IFA | Index | 90.87.R | Negativo Fino a 0,90<br>Bordeline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| BARH | Ab ANTI BARTONELLA HENS. IgM | N | € 17,10 | LuMe | 12 | | IFA | Index | 90.87.R | Negativo Fino a 0,90<br>Bordeline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| BARQG | Ab ANTI BARTONELLA QUINT. IgG | N | € 17,10 | LuMe | 12 | | IIF | Titolo | 90.87.R | < 1:64 |
| BARQ | Ab ANTI BARTONELLA QUINT. IgM | N | € 17,10 | LuMe | 12 | | IIF | Titolo | 90.87.R | < 1:20 |
| B2GLI | Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA I | N | € 7,95 | LuMaMeGiVe | 5 | 100 | Luminex | AU/mL | 90.52.5 | |
| APAA | Ab ANTI BORDET. PERTUSSIS IgA | N | € 13,05 | LuMe | 8 | 131 | EIA | AU | 90.87.S | Negativo < 2,00<br>Borderline 2,00 - 2,50<br>Positivo > 2,50 |
| APG | Ab ANTI BORDET. PERTUSSIS IgG | N | € 13,05 | LuMe | 8 | 130 | IFA | AU | 90.87.S | Negativo < 2,00<br>Borderline 2,00 - 2,50<br>Positivo > 2,50 |
| APM | Ab ANTI BORDET. PERTUSSIS IgM | N | € 13,05 | LuMe | 8 | 145 | IFA | AU | 90.87.S | Negativo < 2,00<br>Borderline 2,00 - 2,50<br>Positivo > 2,50 |
| 1076 | Ab ANTI BP 180 | N | € 50,00 | LuMaMeGi | 15 | | EIA | RU/mL | | < 20,0 |
| 1075 | Ab ANTI BP 230 | N | € 50,00 | LuMaMeGi | 15 | | EIA | RU/mL | | < 20,0 |
| CANAB | Ab ANTI CANDIDA ALBICANS | N | € 70,00 | LuMaMeGiVe | 10 | 106 | EIA | | 91.30.4 | |
| ACA | Ab ANTI CARDIOLIPINA (ACA) | N | € 7,95 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 54 | CLIA | | 90.47.5 | |
| APC | Ab ANTI CELLULE PARIETALI GAS. | N | € 30,00 | Lu | 5 | 140 | IFA | Titolo | 90.48.1 | < 1:40 |
| CEN | Ab ANTI CENTROMERO | N | € 28,00 | Lu | 5 | 121 | IFA | AI/ml | | Negativo < 0,80<br>Borderline 0,80 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| CPA | Ab ANTI CHLAMYDIA PNEUM. IgA | N | € 18,00 | MeSa | 1 | | CLIA | Index | 90.89.1 | Negativo < 5,0<br>Borderline 5,0 - 6,0<br>Positivo > 6,0 |
| CPG | Ab ANTI CHLAMYDIA PNEUM. IgG | N | € 18,00 | MeSa | 1 | 100 | CLIA | Index | 90.89.1 | Negativo < 9,0<br>Borderline 9,0 - 11,0<br>Positivo > 11,0 |
| CPM | Ab ANTI CHLAMYDIA PNEUM. IgM | N | € 18,00 | MeSa | 1 | 100 | CLIA | Index | 90.89.1 | Negativo < 9,0<br>Borderline 9,0 - 11,0<br>Positivo > 11,0 |
| CHPN | Ab ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIE | N | € 66,00 | LuMe | 4 | 175 | EIA | | 90.89.1 | |
| CLAP | Ab ANTI CHLAMYDIA PSITTACI | N | € 44,00 | LuMe | 6 | | IFA | | 90.89.1 | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | Ab ANTI CHLAMYDIA TRACH. IgA | N | € 18,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 54 | CLIA | Index | 90.89.1 | Negativo < 5,0<br>Borderline 5,0 - 6,0<br>Positivo > 6,0 |
| CLG | Ab ANTI CHLAMYDIA TRACH. IgG | N | € 18,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 55 | CLIA | Index | 90.89.1 | Negativo < 5,0<br>Borderline 5,0 - 6,0<br>Positivo > 6,0 |
| CLM | Ab ANTI CHLAMYDIA TRACH. IgM | N | € 25,00 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 124 | CLIA | Index | 90.89.1 | Negativo < 8,5<br>Borderline 8,5 - 11,5<br>Positico > 11,5 |
| CCP | Ab ANTI CITRULLINA IgG (CCP) | N | € 7,95 | LuMaMeGiVeSa | 8 | 87 | EIA | IU | 90.47.D | Assenti 0 - 25<br>Presenti 25 - 50<br>fortemente presenti > 50 |
| ATE | Ab ANTI CLOSTRIDIUM TETANI | N | € 55,00 | LuMaMeGiVe | 7 | 188 | EIA | AU/mL | | 0,50 |
| LUPUS | Ab ANTI COAGULANTI Tipo Lupus | N | € 4,10 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 54 | Coagulometrico DRVVT | | 90.46.5 | |
| COXAG | Ab ANTI COXACKIE VIRUS A Ig | N | € 40,00 | LuMe | 17 | 127 | Fissazione del complemento | Titolo | | Negativo < 1:8<br>Borderline 1:8 - 1:16<br>Debolmente Positivo 1:16 - 1:32<br>Positivo > 1:32 |
| COXBG | Ab ANTI COXACKIE VIRUS B Ig | N | € 40,00 | LuMe | 17 | 103 | Fissazione del complemento | Titolo | | < 1:8 |
| COXBM | Ab ANTI COXACKIE VIRUS B IgM | N | € 40,00 | LuMe | 17 | | Fissazione del complemento | | | Negativo < 0,9<br>Borderline 0,9 - 1,0<br>Positivo > 1,0 |
| ASA | Ab ANTI CUTE | N | € 50,00 | LuMe | 8 | | IFA | | | < 1:20 |
| 1945 | Ab Anti Cute Pannello 10 Ag | N | € 240,00 | | 0 | | IFA | | | |
| CMA | Ab ANTI CYTOMEG. IgG Avidità | N | € 75,00 | LuMaMeGiVe | 4 | 100 | CLIA | Index | 91.14.1 | Alta avidità > 0,25<br>Media avidità 0,15 - 0,25<br>Bassa avidità < 0,15<br>IgG ad alta avidità depongono per una infezione primaria remota nel tempo, con probabile contatto oltre 3 mesi. |
| CMFG | Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS | S | € 31,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 12 | CLIA | | 91.14.1 | |
| CMFM | Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS | N | € 31,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | CLIA | | 91.14.1 | |
| CMF | Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS | N | € 31,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 8 | CLIA | | 91.14.1 | |
| CMFV | Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS | N | € 31,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | CLIA | | 91.14.1 | |
| DENGU | Ab ANTI DENGUE | N | € 96,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | | | 90.88.1 | |
| 1073 | Ab ANTI DESMOGLEINA 1 | N | € 50,00 | LuMaMeGi | 15 | | EIA | RU/mL | | < 20,0 |
| 1074 | Ab ANTI DESMOGLEINA 3 | N | € 50,00 | LuMaMeGi | 15 | | EIA | RU/mL | | < 20,0 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIFTE | Ab ANTI DIPHTHERIAE | N | € 90,00 | LuMaMeGi | 13 | | EIA | IU/mL | | Non protettivo < 0,010<br>Si raccomanda immunizzazione completa<br>Protezione bassa 0,010 - 0,099<br>Si raccomanda richiamo immediato<br>Protezione affidabile 0,100 - 1,000<br>Protezione a lungo termine > 1,0 |
| DNAIF | Ab ANTI DNA NATIVO (nDNA) | N | € 8,00 | Ma | 5 | | IFA | Titolo | 90.48.3 | < 1:10 |
| DNA | Ab ANTI DNA NATIVO (nDNA) | N | € 8,00 | Ma | 5 | 105 | Luminex | IU/mL | 90.48.3 | Negativo < 5,0<br>Borderline 5,0 - 10,0<br>Positovo > 10,0 |
| ECH | Ab ANTI ECHINOCOCCO IgG | N | € 45,00 | LuMaMeGiVe | 8 | 147 | EIA | AU/mL | 90.92.3 | Negativo < 8,5<br>Borderline 8,5 - 11,5<br>Positivo > 11,5 |
| 12649 | Ab ANTI ECHOVIRUS NEUROTROFI | N | € 18,00 | LuMaMeGiVe | 16 | | EIA | Titolo | | Negativo < 9,0<br>Borderline 9,0 - 11,0<br>Positivo > 11,0 |
| 12648 | Ab ANTI ECHOVIRUS PNEUMOTROFI | N | € 18,00 | LuMaMeGiVe | 16 | | EIA | Titolo | | Negativo < 9,0<br>Borderline 9,0 - 11,0<br>Positivo > 11,0 |
| AEA | Ab ANTI ENDOMISIO IgA | N | € 8,90 | LuMaMeGiVeSa | 6 | 93 | IFA | Titolo | 90.47.E | < 1:5 |
| AEIGG | Ab ANTI ENDOMISIO IgG | N | € 8,90 | LuMaMeGiVeSa | 6 | 99 | IFA | Titolo | 90.47.E | < 1:10 |
| ENDOT | Ab ANTI ENDOTELIO | N | € 30,00 | LuMe | 9 | | IFA | | | <1:20 ASSENTI<br>1:20 - 1:40 BASSI<br>1:80 - 1:320 ALTI<br>>1:320 MOLTO ALTI |
| 8983 | Ab Anti EPARINA (PF4) | N | € 95,00 | LuMaMeGi | 15 | | EIA | RU/mL | | < 20,0 |
| HEV | Ab ANTI EPATITE E IgG | N | € 60,00 | LuMaMeGi | 10 | | EIA | Index | | Negativo < 0,8<br>Borderline 0,8 - 1,1<br>Positivo > 1,1 |
| EBV | Ab ANTI EPSTEIN-BARR VIRUS | N | € 39,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | CLIA | | 91.21.6 | |
| INTRI | Ab ANTI FATTORE INTRINSECO | N | € 70,00 | LuMe | 18 | | EIA | AU/mL | | < 12,0 |
| FILAB | Ab ANTI Filariasi | N | € 72,00 | LuMaMeGi | 12 | | EIA | AU/mL | | Fino a 10,0 |
| PLA2R | Ab ANTI Fosfolipasi A2 Recett. | N | € 38,00 | LuMaMeGiVe | 18 | | IFA | U/mL | | Assenti |
| FOS | Ab ANTI FOSFOLIPIDI | N | € 70,00 | LuGi | 11 | 170 | EIA | U/mL | | |
| 1052 | Ab ANTI FRANCISELLA TULAR. IgG | N | € 33,00 | LuMaMeGi | 12 | | EIA | U/mL | | < 10 |
| 436 | Ab ANTI FRANCISELLA TULAR. IgM | N | € 33,00 | LuMaMeGi | 12 | | EIA | U/mL | | < 10 |
| GAD | Ab ANTI GAD (Glut. decarboss.) | N | € 45,00 | Lu | 4 | 102 | CLIA | U/mL | | Negativo < 5<br>Borderline 5 - 10<br>Positivo > 10 |
| 1680 | Ab ANTI GANGLIOSIDE IgG | N | € 90,00 | LuMaMeGi | 18 | | BLOT | | | |
| 1681 | Ab ANTI GANGLIOSIDE IgM | N | € 90,00 | LuMaMeGi | 18 | | BLOT | | | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA | Ab ANTI GLIADINA DEAMIDATA GDP | N | € 8,90 | LuMaMeGiVeSa | 6 | 78 | EIA 2° generazione | | 90.49.5 | |
| AGAND | Ab ANTI GLIADINA NON DEAMIDATA | N | € 8,90 | LuGi | 7 | | EIA | | 90.49.5 | |
| HIB | Ab ANTI HAEMOPH. INFLUENZAE B | N | € 25,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | Immunometrico | Index | | |
| 432 | Ab ANTI HAEMOPHILUS IN. TIPO B | N | € 30,00 | LuMaMeGi | 12 | | EIA | U/mL | | < 0,15<br>Nella valutazione della protezione:<br>Protezione insufficiente < 0,15<br>Paziente parzialmente immunizzato 0,15 - 1,0<br>Immunità sufficiente > 1,0 |
| ABM | Ab ANTI HAV IgM | N | € 14,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 31 | CLIA | Index | 91.17.2 | Negativo < 0,9<br>Borderline 0,9 - 1,1<br>Positivo > 1,1 |
| ABG | Ab ANTI HAV TOTALI | N | € 14,50 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 25 | CLIA | Index | 91.17.1 | > 1,1 |
| ABC | Ab ANTI HBc | N | € 12,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 20 | CLIA | Index | 91.18.3 | Negativo Fino a 0,90<br>Borderline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| HBC | Ab ANTI HBc Ab IgM | N | € 12,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 8 | CLIA | Index | 91.18.2 | Negativo Fino a 0,80<br>Borderline 0,80 - 1,00<br>Positivo > 1,00 |
| ABE | Ab ANTI HBe Ag | S | € 5,40 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 18 | CLIA | Index | 91.18.2 | Negativo Fino a 0,80<br>Borderline 0,80 - 1,20<br>Positivo > 1,20 |
| ABS | Ab ANTI HBs Ag | S | € 4,75 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 11 | CLIA | mIU/mL | 91.18.3 | < 9,0 |
| HCV | Ab ANTI HCV | S | € 6,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA 3° generazione | Index | 91.19.5 | Negativo Fino a 1,00<br>Borderline 1,00 - 1,20<br>Positivo > 1,20<br>Test CLIA di 3° generazione. I risultati borderline o positivi debbono essere integrati con ricerca specifica degli |
| HCVIM | Ab ANTI HCV IgM | N | € 6,95 | LuMe | 8 | | EIA | Index | 91.19.5 | Negativo |
| HCVCO | Ab ANTI HCV RIBA | N | € 4,40 | LuMaMeGiVe | 13 | | Immunoblot | | 90.20.1 | |
| HDVG | Ab ANTI HDV IgG | N | € 32,00 | LuGi | 7 | 182 | EIA | Index | 91.20.3 | Negativo < 0,90<br>Borderline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| HDVM | Ab ANTI HDV IgM | N | € 32,00 | LuGi | 7 | 182 | EIA | Index | 91.20.4 | Negativo < 0,90<br>Borderline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| HP | Ab ANTI HELICOBACTER PYLORI | N | € 42,00 | LuMaMeGiVe | 7 | 165 | EIA | AU/mL | 90.94.4 | |
| H1G | Ab ANTI HERPES 1 IgG | N | € 20,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 23 | CLIA | Index | 91.22.1 | Negativo Fino a 0,90<br>Borderline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| H12M | Ab ANTI HERPES 1/2 IgM | N | € 20,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 17 | CLIA | Index | 91.22.1 | Negativo Fino a 0,90<br>Borderline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2G | Ab ANTI HERPES 2 IgG | N | € 20,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 18 | CLIA | Index | 91.22.1 | Negativo Fino a 0,90<br>Borderline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| H6T | Ab ANTI HERPES VIRUS 6 IgG | N | € 80,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | IFA | Titolo | 91.21.5 | < 0,9 |
| 1565 | Ab ANTI HERPES VIRUS 8 Totali | N | € 45,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | IFA | Titolo | 91.21.5 | < 1:100 |
| HIVR | Ab ANTI HIV (RIBA) | N | € 180,00 | LuMe | 14 | | Dot Blot | | 91.22.5 | |
| HIV | Ab ANTI HIV 1-2 + Ag HIV P24 | N | € 25,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA 4° generazione | Index | 91.23.F | Negativo Fino a 1,00<br>Borderline 1,00 - 1,20<br>Positivo > 1,20<br>La metodica di 4° generazione consente la rilevazione contemporanea degli anticorpi anti HIV 1-2 e dell'antigene pr |
| HTLV | Ab ANTI HTLV 1-2 | N | € 16,35 | LuGi | 7 | | CLIA | Index | 91.26.3 | Negativo < 0,9<br>Borderline 0,9 - 1,1<br>Positivo > 1,1 |
| 1377 | Ab ANTI IA2 (Tirosinfosfatasi) | N | € 80,00 | LuMaMeGi | 18 | | RIA | U/mL | | < 28,0 |
| INFAB | Ab ANTI INFLUENZA A | N | € 45,00 | LuMaMeGi | 10 | | EIA | Index | | Negativo < 0,8<br>Borderline 0,8 - 1,1<br>Positivo > 1,1 |
| AIP | Ab ANTI INSULA PANCREATICA | N | € 9,50 | LuMe | 10 | | IFA | Titolo | 90.50.5 | < 1:10 |
| AAI | Ab ANTI INSULINA | N | € 8,20 | LuMe | 9 | 79 | CLIA | IU/mL | 90.51.1 | < 20,0 |
| AAIST | Ab ANTI ISTONI | N | € 8,00 | LuMaMeGiVe | 7 | | EIA | AU/mL | 90.48.3 | < 1,0 |
| LEGI | Ab ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA | N | € 40,00 | LuMe | 7 | | EIA | Titolo | 90.95.2 | |
| LES | Ab ANTI LEISHMANIA IgG | N | € 16,90 | LuMe | 8 | | IFA | | 90.96.1 | Titolo significativo se > 1:80 |
| LIS | Ab ANTI LYSTERIA MONOCYTOGENES | N | € 35,00 | LuMe | 10 | | Agglutinazione | | 90.97.1 | < 1:32 |
| 1584 | Ab ANTI MAG (Gl. Mielina Ass.) | N | € 30,00 | LuMaMeGi | 18 | | EIA | BTU | | Negativo < 1000<br>Borderline 1000 - 1500<br>Positivo > 1500 |
| MALAB | Ab ANTI MALARIA FALCIPARUM | N | € 35,00 | LuMaMeGi | 12 | 149 | IFA | Titolo | | Negativo Fino a 9,00<br>Bordeline 9,00 - 11,00<br>Positivo > 11,0 |
| AMB | Ab ANTI MEMBRANA BASALE GLOM. | N | € 45,00 | LuMe | 10 | | IFA | Titolo | | < 1:20 |
| LKM | Ab ANTI MICROSOMI (LKM) | N | € 8,20 | Ma | 5 | | IFA | Titolo | 90.51.5 | < 1:40 |
| AMA | Ab ANTI MITOCONDRI (AMA) | N | € 8,30 | Ma | 5 | | IFA | Titolo | 90.52.1 | < 1:40 |
| ATG | Ab ANTI MORBILLO IgG | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 96 | CLIA | mIU/mL | 91.24.3 | Assenti < 13,50<br>Borderline 13,50 - 16,50<br>Presenti > 16,50 |
| ATM | Ab ANTI MORBILLO IgM | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 107 | CLIA | Index | 91.24.4 | Assenti < 0,90<br>Borderline 0,90 - 1,10<br>Presenti > 1,10 |
| ASM | Ab ANTI MUSCOLO LISCIO (ASM) | N | € 8,20 | Ma | 5 | 154 | IFA | Titolo | 90.52.2 | < 1:40 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUS | Ab ANTI MUSCOLO STRIATO | S | € 20,15 | LuMe | 4 | 103 | IFA | Titolo | 90.52.3 | < 1:100 |
| 6235 | Ab ANTI MUSK | N | € 120,00 | LuMaMeGi | 24 | | EIA | U/mL | | Fino a 0,40 |
| MYTBR | Ab ANTI MYCOBACTERIUM TUBERC. | N | € 25,00 | LuMaMeGiVe | 2 | 146 | Immunocromatografico | | | Test di screening per la ricerca di anticorpi anti Mycobacterium tuberculosis di tipo IgA, IgG ed IgM. Cut-off 350 U/ml.<br>In caso di esito positivo si suggerisce conferma mediante Quantiferon TbGold. |
| AAM | Ab ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE | N | € 60,00 | LuMe | 5 | 100 | CLIA | | 91.03.1 | |
| ANC | Ab ANTI NEUTROFILI | N | € 12,60 | LuMe | 7 | 108 | EIA | | 90.48.2 | |
| HEP | Ab ANTI NUCLEO (ANA-HEP2) | N | € 8,50 | Ma | 5 | 108 | IFA | Titolo | 90.52.4 | < 1:160 |
| ENA25 | Ab Anti NUCLEO 25 Antigeni | N | € 240,00 | | 0 | 123 | IFI | | | |
| 1943 | Ab Anti Nucleolare 15 Ag | N | € 140,00 | LuMaMeGiVe | 15 | | IFA | | | |
| AAO | Ab ANTI OVAIO | N | € 29,10 | LuMe | 12 | | IFA | Titolo | 90.53.1 | < 1:10 Assenti<br>1:10 - 1:40 Debolm. presenti<br>1:40 - 1:320 Presenti<br>> 1:320 Fortem. presenti |
| AAPG | Ab ANTI PAROTITE RUBULAV. IgG | N | € 26,00 | LuMaMeGiVe | 8 | 65 | CLIA | Index | 91.25.1 | < 9,0 |
| AAPM | Ab ANTI PAROTITE RUBULAV. IgM | N | € 26,00 | LuMaMeGiVe | 8 | 56 | CLIA | Index | 91.25.1 | < 0,90 |
| PVB | Ab ANTI PARVOVIRUS B19 | N | € 70,00 | LuMaMeGi | 6 | | EIA | UA | 91.25.4 | |
| 1571 | Ab ANTI PARVOVIRUS B19 IgG | N | € 35,00 | LuMaMeGi | 5 | 101 | EIA | AU/mL | 91.25.4 | Negativo < 2,00<br>Borderline 2,00 - 2,50<br>Positivo > 2,50 |
| 1572 | Ab ANTI PARVOVIRUS B19 IgM | S | € 35,00 | LuMaMeGi | 5 | 101 | EIA | AU/mL | 91.25.4 | Negativo < 0,90<br>Borderline 0,90 - 1,10<br>Positivo > 1,10 |
| TPO | Ab ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA | S | € 8,50 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | U/mL | 90.51.4 | < 60 |
| ABPIA | Ab ANTI PIASTRINE | N | € 120,00 | LuMaMeGi | 9 | | EIA | | 90.53.2 | |
| PIGA | Ab ANTI PIASTRINE IgA | N | € 50,00 | LuMe | 6 | | IFA | Titolo | 90.53.2 | < 1:20 |
| PIGG | Ab ANTI PIASTRINE IgG | N | € 50,00 | LuMe | 6 | | IFA | Titolo | 90.53.2 | < 1:20 |
| PIGM | Ab ANTI PIASTRINE IgM | N | € 50,00 | LuMe | 6 | | IFA | Titolo | 90.53.2 | < 1:20 |
| PNEU | Ab ANTI PNEUMOCOCCO IgG | N | € 24,00 | LuMaMeGiVe | 23 | | EIA | | | < 3,3 |
| POLIO | Ab ANTI POLIOVIRUS (ENTEROV.) | N | € 120,00 | LuMaMeGiVe | 13 | | Agglutinazione | | | < 1:4 |
| AAC | Ab ANTI RECETTORI ACETILCOLINA | N | € 75,00 | Gi | 8 | 154 | RIA | nMol/L | | Negativo < 0,25<br>Borderline 0,25 - 0,40<br>Positivo > 0,40 |
| TSR | Ab ANTI RECETTORI TSH | S | € 25,10 | LuMaMeGiVe | 6 | 103 | CLIA | U/L | 90.53.5 | Fino a 1,75 |
| ARA | Ab ANTI RETICOLINA | N | € 32,00 | Lu | 7 | | IFA | | | Assenti |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICKC | Ab ANTI RICKETTSA COONORII | N | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 13 | 187 | IFA | | 91.06.5 | |
| RICKM | Ab ANTI RICKETTSA TYPHI | N | € 24,00 | LuMe | 11 | 71 | IFA | | 91.06.5 | |
| RICK | Ab ANTI RICKETTSIE | N | € 70,00 | LuMe | 9 | 221 | IFA | | 91.06.5 | |
| ROTAB | Ab ANTI ROTAVIRUS | N | € 70,00 | LuMe | 15 | | | | | |
| RGMV | Ab ANTI RUBELLA | N | € 31,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 5 | CLIA | | 91.26.4 | |
| RGMM | Ab ANTI RUBELLA | N | € 17,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 14 | CLIA | | 91.26.4 | |
| RGM | Ab ANTI RUBELLA | N | € 31,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 8 | CLIA | | 91.26.4 | |
| RGMG | Ab ANTI RUBELLA | N | € 17,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 14 | CLIA | | 91.26.4 | |
| ROS | Ab Anti RUBELLA IgG | N | € 16,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | | CLIA | IU/mL | 91.26.4 | Negativo Fino a 7,0<br>Borderline 7,0 - 10,0<br>Positivo > 10,0 |
| RGMA | Ab ANTI RUBELLA IgG Avidità | N | € 50,00 | LuMaMeGiVe | 2 | 120 | CLIA | Index | 91.26.4 | Alta Avidità > 0,40<br>Media Avidità 0,30 - 0,40<br>Bassa Avidità < 0,30<br><br>IgG ad alta avidità depongono per una infezione primaria remota nel tempo.<br><br>IgG a bassa avidità depongono per una infez |
| IGR | Ab Anti RUBELLA IgM | N | € 16,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | | CLIA | U/mL | 91.26.4 | Negativo Fino a 20,0<br>Borderline 20,0 - 25,0<br>Positivo > 25,0 |
| RUBMC | Ab ANTI RUBELLA IgM Conferma | N | € 0,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 17 | CLIA | Index | 91.26.4 | Valori di index < 0,25 fanno propendere per probabile reattività specifica al test delle IgM Anti Rubella.<br><br>Pobabile reattività specifica < 0,25<br>Possibile reattività aspecifica 0,25 - 0,50<br>Probabile reattività aspecifica > 0,50 |
| ASCAA | Ab ANTI SACCHAROMYCES C. IgA | N | € 60,00 | LuMe | 12 | | ELIA | U/mL | | Negativo < 20,0<br>Borderline 20,0 - 25,0<br>Presenti > 25,0 |
| ASCAG | Ab ANTI SACCHAROMYCES C. IgG | N | € 60,00 | LuMe | 12 | | ELIA | U/mL | | Negativo < 20,0<br>Borderline 20,0 - 25,0<br>Presenti > 25,0 |
| COVIM | Ab Anti SARS-COV-2 | N | € 5,75 | LuMaMeGiVeSa | 2 | | ELFA | | 90.13.1 | |
| COVIT | Ab Anti SARS-COV-2 Nucleocaps. | N | € 5,75 | LuMaMeGiVeSa | 8 | 144 | ECLIA | | 90.13.1 | Negativo Fino a 1,00<br>Positivo > 1,00<br><br>Il test ricerca anticorpi totali (IgA, IgG, IgM) diretti contro la componente nucleocapsidica del virus, non presente nelle preparazioni vaccinali.<br><br>Nella valu |
| COVID | Ab Anti SARS-COV-2 SPIKE RBD | N | € 8,30 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 101 | CLIA | | 91.13.1 | |
| COVIG | Ab Anti SARS-COV-2 SPIKE RBD | N | € 5,75 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 85 | CLIA | | 90.13.1 | |
| 116 | Ab ANTI SCHISTOSOMA SCREENING | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 16 | | EIA | AU/mL | | Negativo < 9,0<br>Borderline 9,0 - 11,0<br>Positivo > 11,0 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE | Ab ANTI SPERMATOZOI | N | € 50,00 | LuMe | 7 | | IFA | | 90.54.1 | Negativo |
| TAS | Ab ANTI STREPTOLISINA O (TAS) | S | € 4,90 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Turbidimetria | IU/mL | 91.08.5 | Fino a 225 |
| 1161 | Ab ANTI STRONGLYLOIDES IgG IgM | N | € 60,00 | LuMaMeGi | 17 | | EIA | U/mL | | 0,0 - 8,5 |
| ANS | Ab ANTI SURRENE | N | € 19,70 | LuMaMeGi | 8 | | IFA | Titolo | 90.54.3 | < 1:10 |
| ATT | Ab ANTI TIREOGLOBULINA | S | € 7,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | IU/mL | 90.54.4 | Fino a 100 |
| 13216 | Ab ANTI TOXOCARA CANIS SCREEN. | N | € 60,00 | LuMaMeGi | 17 | | EIA | U/mL | | Negativo < 8,5<br>Borderline 8,5 - 11,5<br>Positivo > 11,5 |
| 1214 | Ab ANTI TOXOCARA TEST CONFERMA | N | € 150,00 | LuMaMeGi | 14 | | BLOT | | | |
| TGA | Ab ANTI TOXOPL. IgG Avidità | N | € 75,00 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 59 | CLIA | Index | 91.09.4 | Alta Avidità > 0,30<br>Media Avidità 0,20 - 0,30<br>Bassa Avidità < 0,20<br>IgG ad alta avidità depongono per una infezione primaria remota nel tempo, con probabile contatto oltre 4 mesi.<br>IgG a |
| TGMV | Ab ANTI TOXOPLASMA GONDII | S | € 31,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 8 | CLIA | | 91.09.4 | |
| TGMG | Ab ANTI TOXOPLASMA GONDII | N | € 17,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 13 | CLIA | | 91.09.4 | |
| TGM | Ab ANTI TOXOPLASMA GONDII | N | € 31,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | | 91.09.4 | |
| TGMM | Ab ANTI TOXOPLASMA GONDII | S | € 17,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 11 | CLIA | | 91.09.4 | |
| TOXOA | Ab ANTI TOXOPLASMA IgA | N | € 30,00 | LuMe | 9 | | Immunometrico | U/mL | 91.09.4 | Negativo < 0,80<br>Borderline 0,80 - 1,20<br>Positivo 1,20 |
| TGT | Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | N | € 9,70 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 11 | CLIA | U/mL | 90.53.D | Fino a 8,00 |
| TGIGG | Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG | N | € 8,90 | LuMaMeGiVeSa | 6 | 66 | EIA | U/mL | 90.53.D | Negativo < 4,0<br>Borderline 4,0 - 10,0<br>Positivo > 10,0 |
| TREAB | Ab ANTI TREPONEMA PALLIDUM | N | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 8 | 96 | CLIA | | | |
| MYCAB | Ab ANTI UREAPLASMA UREALYTICUM | N | € 54,00 | LuMe | 21 | | DOT | Titolo | 91.02.5 | Assenti |
| VAR | Ab ANTI VARICELLA ZOST. (HSV3) | N | € 55,00 | LuMaMeVe | 1 | 14 | CLIA | | 91.26.C | |
| SINCI | Ab ANTI VIRUS RESP. SINCIZIALE | N | € 40,00 | LuGi | 7 | | EIA | | | |
| 6203 | Ab ANTI WEST NILE IgG | N | € 37,00 | LuMaMeGi | 10 | 133 | EIA | VIEU/ml | | < 165 |
| 6204 | Ab ANTI WEST NILE IgM | N | € 37,00 | LuMaMeGi | 10 | 133 | EIA | VIEU/ml | | < 165 |
| YERSA | Ab ANTI YERSINIA IgA | N | € 80,00 | | 21 | | BLOT | | | Negativo |
| YERSG | Ab ANTI YERSINIA IgG | N | € 80,00 | | 21 | | BLOT | | | Negativo |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNT8 | Ab Anti ZnT8 (Trasp. Zinco) | N | € 95,00 | LuMaMeGi | 17 | | EIA | U/mL | | Fino a 15,0 |
| 1268 | Ab ANTI Zn-T8a | N | € 105,00 | LuMaMeGi | 21 | | EIA | U/mL | | < 15,0 |
| EPAI | Ab EPATOPATIE AUTOIMMUNI | N | € 80,00 | LuMaMeGi | 16 | | Immunoblot | | | |
| PLAC2 | Ab FOSFOLIPASI A2 (Lp PLA2) | N | € 4,85 | LuMe | 5 | 171 | Immunoturbidimetrico | nMol/L | 90.30.3 | Basso rischio < 560<br>Medio rischio 560 - 620<br>Rischio aumentato 620 - 635<br>Rischio Alto > 635 |
| ABL1 | aBL1 T315I Res. in. tisorinch. | N | € 180,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | Next Generation Sequencing | | | Negativo |
| ACE | ACE | N | € 35,00 | LuMaMeGiVe | 7 | 77 | Enzimatico UV | U/L | | Adulti: 20 - 70<br>Bambini: 33 - 112 |
| ACEMU | ACE MUTAZIONE | N | € 100,00 | MaGi | 14 | | PCR | | | Negativo |
| ETILA | ACETATO DI ETILE | N | € 30,00 | LuMe | 8 | | GC MS | | | |
| ACETS | ACETONE | N | € 25,00 | LuMaMeGiVe | 11 | | GC MS | mg/L | | Soggetti non esposti < 2,0<br>Soggetti esposti < 50,0 |
| 208 | ACETONE EMATICO | N | € 25,00 | | 0 | | | | | |
| ACETO | ACETONE URINE SPOT | N | € 30,00 | LuMe | 5 | | GC MS | mg/L | | Soggetti non esposti < 2,0<br>Soggetti esposti < 50,0 |
| BIL | ACIDI BILIARI | N | € 6,10 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 8 | Enzimatico | mMol/L | 90.01.5 | < 6,00<br>I campioni dei pazienti in terapia con acido ursodesossicolico non sono idonei per il test. |
| ACLUN | ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA | N | € 100,00 | LuMaMe | 11 | | GC MS | | | |
| NEFA | ACIDI GRASSI NON ESTERIFICATI | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 16 | | Chimico | mg/dL | | Uomo: 100 - 600<br>Donna: 100 - 450<br>Bambini: 100 - 450 |
| IND | ACIDO 5 OH3-INDOLACETICO | N | € 14,10 | LuMaMeGiVe | 10 | 171 | HPLC | mg/24h | 90.02.1 | 2,0 - 9,0 |
| ACCLS | ACIDO CITRICO LIQUIDO SEMINALE | N | € 3,40 | LuMe | 7 | | Enzimatico | % | 90.02.2 | 200 - 600 |
| ACF | ACIDO FENILGLIOSSILICO | N | € 35,00 | LuMe | 15 | | HPLC | g/g creat | | In esposizione allo stirene < 0,25 |
| FOL | ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) | S | € 5,15 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 9 | CLIA | ng/mL | 90.23.2 | > 5,38 |
| IPP | ACIDO IPPURICO (Fine t.) | N | € 25,00 | LuMaMeGiVeSa | 18 | | HPLC | g/g creat | 90.02.4 | < 1,60 |
| IPI | ACIDO IPPURICO (Inizio t.) | N | € 25,00 | LuMaMeGiVeSa | 18 | | HPLC | g/g creat | 90.02.4 | < 1,60 |
| LAT | ACIDO LATTICO | N | € 6,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 36 | ECLIA | mMol/L | 90.02.5 | 0,56 - 1,39 |
| MAN | ACIDO MANDELICO | N | € 35,00 | LuMaMeGiVe | 10 | | HPLC | mg/g creat | | Fino a 400 |
| MMA | ACIDO METIL MALONICO | N | € 70,00 | | 13 | | LC MSMS | ug/L | | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METIT | ACIDO METILIPPURICO (Fine t.) | N | € 28,00 | LuMaMeGiVeSa | 15 | | HPLC | g/g creat | | < 1,50 |
| MET | ACIDO METILIPPURICO(Inizio t.) | N | € 28,00 | LuMaMeGiVeSa | 15 | | HPLC | g/g creat | | < 1,50 |
| AOM | ACIDO OMOVANILICO | N | € 42,00 | LuMe | 10 | | HPLC | uMol/24h | | Adulti: < 48,0<br>Bambini: < 26,0 |
| PIR | ACIDO PIRUVICO | N | € 1,05 | LuGi | 10 | | Enzimatico | mg/dL | 90.03.2 | 0,3 - 0,7 |
| ACTRF | ACIDO TRANSMUCONICO (Fine t.) | N | € 40,00 | LuMaMeGiVe | 13 | 173 | HPLC | ug/g creat | | Soggetti non esposti < 165<br>Soggetti esposti < 500 |
| ACTRA | ACIDO TRANSMUCONICO Inizio t. | N | € 40,00 | LuMaMeGiVe | 13 | | HPLC | ug/g creat | | Soggetti non esposti < 165<br>Soggetti esposti < 500 |
| URI | ACIDO URICO | S | € 1,05 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Enzimatico | mg/dL | 90.43.5 | Uomo: 2,80 - 7,00<br>Donna: 1,80 - 5,70<br>Bambini: 1,80 - 5,70 |
| URU | ACIDO URICO URINE | N | € 1,05 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 27 | Enzimatico Colorimetrico | mg/24h | 90.43.5 | |
| URUSP | ACIDO URICO URINE SPOT | N | € 1,05 | LuMaMeGiVe | 1 | 15 | Enzimatico Colorimetrico | mg/dL | 90.43.5 | Adulti: 15,0 - 60,0<br>Bambino: 5,0 - 35,0<br>Bambina: 5,' 35,0 |
| VAL | ACIDO VALPROICO (DEPAKIN) | N | € 25,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 10 | Turbidimetria | ug/mL | 90.17.C | 50,0 - 100,0 |
| ACM | ACIDO VANILMANDELICO | N | € 30,00 | LuGi | 13 | 112 | Cromatografico | mg/24h | 90.03.5 | Adulti: 1,00 - 10,00<br>Bambini: 3 - 8 Anni 0,20 - 2,40<br>9 - 12 Anni 0,50 - 3,90<br>13 - 17 Anni 0,80 - 4,40<br>Adulti 1,00 - 10,00 |
| GCDH | ACIDURIA GLUTARICA TIPO I | N | € 400,00 | | 33 | | PCR | | | Negativo |
| ADEFE | ADENOVIRUS Ag FECALE | N | € 16,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | Immunometrico | | 91.13.4 | Negativo |
| ADH | ADH (Ormone Antidiuretico) | N | € 10,80 | LuMe | 21 | | RIA | pg/mL | 90.04.1 | Fino a 13,0 |
| AGTR1 | AGTR1 A1166C | N | € 120,00 | LuGi | 14 | | Dot Blot | | 90.64.3 | Un risultato negativo indica assenza della mutazione. La sostituzione della base guanina 1691 con adenina (mutazione G1691A) determina la sostituzione dell'amminoacido arginina con glutamina (R506Q). Esame eseguito mediante estrazione del DNA, amplifica |
| ALBSI | ALBUMINA | N | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | Nefelometrico | mg/dL | 90.05.1 | 3660 - 5100 |
| MIC | ALBUMINA URINE | N | € 3,40 | LuMaMeGiVe | 2 | 39 | Turbidimetria | mg/L | 90.33.4 | |
| MICSP | ALBUMINA URINE SPOT | N | € 3,40 | LuMaMeGiVe | 2 | 10 | Turbidimetria | mg/L | 90.33.4 | |
| ETI | ALCOL ETILICO | N | € 4,40 | LuMaMeGiSa | 2 | 67 | Enzimatico | mg/dL | 90.20.1 | < 0,40 |
| ALS | ALDOLASI | | € 0,90 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 32 | Enzimatico UV | U/L | 90.05.2 | < 7,6 |
| ALDCL | ALDOSTERONE (Clinostatismo) | S | € 14,60 | Me | 8 | 10 | CLIA | ng/dL | 90.05.3 | 1,76 - 23,20 |
| ALDMO | ALDOSTERONE (Dopo moto) | S | € 14,60 | Me | 2 | 4 | CLIA | ng/dL | 90.05.3 | 2,60 - 45,40 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDOR | ALDOSTERONE (Ortostatismo) | S | € 14,60 | Me | 2 | 16 | CLIA | ng/dL | 90.05.3 | 2,52 - 39,20 |
| ALU | ALDOSTERONE URINE | S | € 14,60 | Ma | 4 | 48 | CLIA | ug/24 h | 90.05.3 | 1,19 - 28,10 |
| FABER | ALEX TEST (FABER) | N | € 282,50 | LuMaMeGiVe | 15 | | Microarray | | | |
| A1A | ALFA 1 ANTITRIPSINA | S | € 3,40 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 8 | Nefelometrico | mg/dL | 90.05.4 | 90 - 200 |
| A1AFE | ALFA 1 ANTITRIPSINA FECALE | N | € 50,00 | LuMaMeGi | 13 | | EIA | ug/g Steat | | Fino a 400 |
| 1151 | ALFA 1 ANTITRIPSINA FECALE | N | € 40,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | RIA | ng/mL | | < 268 |
| MUC | ALFA 1 GLICOPROT. AC. (MUCOPR) | S | € 5,30 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 9 | Nefelometrico | mg/dL | 90.06.1 | Uomo: 50,0 - 130,0<br>Donna: 40,0 - 120,0<br>Bambini: 40,0 - 130,0 |
| 525 | ALFA 1 MICROGLOBULINA URINE | N | € 7,15 | LuMaMeGi | 5 | 101 | Immunoturbidimetrico | mg/g creat | 90.06.2 | < 14,0 |
| ALFA2 | ALFA 2 MACROGLOBULINA | N | € 5,30 | LuMaMeGiVe | 6 | 123 | Nefelometrico | g/L | 90.06.3 | 1,30 - 3,00 |
| AFA | ALFA 3 ANDROSTENEDIOLO | N | € 12,60 | LuMe | 10 | | RIA | ng/mL | 90.08.1 | Donna: In età fertile 0,30 - 2,80<br>Menopausa 0,40 - 3,40<br>Uomo: 0,10 - 2,10<br>Bambino:<br>Bambina: |
| AFP | ALFAFETOPROTEINA | S | € 7,40 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | CLIA | ng/mL | 90.05.5 | Fino a 6,00 |
| AFPG | ALFAFETOPROTEINA (Gravidanza) | S | € 7,40 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 8 | CLIA | ng/mL | 90.05.5 | Donna: Mediana Riferimento<br>1 - 13 sett. 2,0 - 35,0<br>14 sett. 27,2 13,0 - 36,0<br>15 sett. 31,3 14,0 - 62,6<br>16 sett. 36,3 16,0 - 72,6<br>17 sett. 42 |
| ALL | ALLUMINIO | N | € 8,00 | LuMe | 11 | | Assorbimento Atomico | ng/mL | 90.07.1 | < 6,00 |
| ALLU | ALLUMINIO URINE SPOT | N | € 8,00 | LuMe | 11 | | Assorbimento Atomico | ug/g creat | 90.07.1 | Soggetti esposti < 60,0<br>Soggetti non esposti < 13,0 |
| ALOP | ALOPERIDOLO | N | € 85,00 | LuMaMeGi | 16 | | HPLC | ug/L | | 1,0 - 10,0 |
| m229 | Alt a 1 Alternaria alternata | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| AMSP | AMILASI PANCREATICA | N | € 3,65 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 33 | Cinetico | U/L | 90.06.5 | 13 - 53 |
| AMSS | AMILASI SALIVARE | N | € 0,00 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 99 | Calcolato Matematicamente | U/L | 90.06.5 | < 47 |
| AMS | AMILASI TOTALE | S | € 1,25 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Cinetico | U/L | 90.06.4 | Adulti: 30 - 118<br>Bambini: Fino a 118 |
| AMU | AMILASI URINE | N | € 1,25 | LuMaMeGiVe | 2 | 62 | Cinetico UV | U/L | 90.06.4 | Fino a 490 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIO | AMIODARONE | N | € 90,00 | LuMe | 20 | | HPLC | mg/L | 90.21.1 | 0,50 - 2,00 |
| AMITR | AMITRIPTILINA | N | € 60,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | LC MSMS | | | |
| AMM | AMMONIO | S | € 6,00 | LuMaMeGiVe | 1 | 12 | Enzimatico UV | ug/dL | 90.07.5 | 18 - 121 |
| f443 | Ana o 3 Anacardium occidental | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| AFG | ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE | N | € 12,60 | Gi | 6 | 190 | RIA | ng/mL | 90.08.1 | Uomo: 3,40 - 22,0<br>Donna: In età fertile 0,50 - 5,40<br>Postmenopausa 0,10 - 6,00 |
| ANG2 | ANGIOTENSINA II | N | € 15,25 | LuMaMeGiVe | 23 | | RIA | ng/L | 90.08.2 | 20,0 - 40,0 |
| P4 | Anisakis | N | € 20,00 | LuMe | 7 | 170 | IMMUNOCAP | IU/mL | | 0,00 - 0,35 |
| AXU | ANTIBIOGRAMMA | N | € 13,50 | LuMaMeGiVeSa | 3 | | Kirby B. | | 90.85.1 | |
| N379 | ANTIBIOGRAMMA (MIC) | N | € 13,50 | LuMaMeGiVe | 2 | 64 | Microscopia digitale | | 90.85.2 | |
| P659 | ANTIBIOGRAMMA (MIC) | S | € 13,50 | LuMaMeGiVe | 2 | | Microdiluizione automatizzata | | 90.85.2 | |
| P632 | ANTIBIOGRAMMA (MIC) | N | € 13,50 | LuMaMeGiVe | 2 | | Microdiluizione automatizzata | | 90.85.1 | |
| ST01 | ANTIBIOGRAMMA (MIC) | N | € 13,50 | LuMaMeGiVe | 2 | | Microdiluizione automatizzata | | 90.85.1 | |
| TA4 | ANTIGENE TA4 (SCC) | N | € 22,00 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 66 | CLIA | ng/mL | 90.57.1 | Fino a 1,90 |
| GEM | ANTIMICOGRAMMA | N | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 7 | 95 | Colt. Bioch. | | 90.93.3 | |
| AT3 | ANTITROMBINA III FUNZIONALE | N | € 3,05 | LuMaMeGiVe | 1 | 9 | Cromogenico | % | 90.57.5 | 83,0 - 128,0 |
| AT3MU | ANTITROMBINA III SERPINC1 MUT. | N | € 560,00 | LuMe | 16 | | PCR | | | Negativo |
| APCR | APCR (Res. Prot. C Attivata) | N | € 3,65 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 51 | Coagulometrico DRVVT | | 90.77.2 | |
| i208 | Api m 1 Apis mellifera | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 124 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| i217 | Api m 10 Apis mellifera | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| i214 | Api m 2 Apis mellifera | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| i215 | Api m 3 Apis mellifera | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| i216 | Api m 5 Apis mellifera | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| APA | APOLIPOPROTEINA A1 | N | € 3,25 | LuMaMeGiVe | 3 | 45 | Nefelometrico | mg/dL | 90.08.4 | Uomo: 90 - 170<br>Donna: 108 - 185<br>Bambini: 90 - 170 |
| APB | APOLIPOPROTEINA B | N | € 3,35 | LuMaMeGiVe | 3 | 45 | Nefelometrico | mg/dL | 90.08.5 | Uomo: 45 - 139<br>Donna: 51 - 128<br>Bambini: 45 - 139 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOE | APOLIPOPROTEINA E | N | € 3,25 | LuMaMeGiVe | 3 | 148 | Nefelometrico | mg/L | 90.08.4 | 23,0 - 63,0 |
| APT | APTOGLOBINA | N | € 5,10 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 11 | Nefelometrico | mg/dL | 90.09.1 | 30 - 200<br>Una dimunuzione dell'aptoglobulina sierica può indicare emolisi in vivo o insufficienza epatica. |
| f422 | Ara h 1 Arachis hypogaea | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f423 | Ara h 2 Arachis hypogaea | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f424 | Ara h 3 Arachis hypogaea | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f447 | Ara h 6 Arachis hypogaea | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f427 | Ara h 9 Arachis hypogaea | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 128 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| ADHN | ARGININ VASOPRESSINA (ADH) | N | € 10,80 | LuMe | 12 | | RIA | pg/mL | 90.04.1 | Fino a 13,0 |
| ARSU | ARSENICO URINE SPOT | N | € 34,00 | LuMe | 14 | | Assorbimento Atomico | ug/L | | < 35 |
| w231 | Art v 1 Artemisia vulgaris | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| w233 | Art v 3 Artemisia vulgaris | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| M218 | Asp f1 Apspergillus fumigatus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 196 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| M219 | Asp f2 Apspergillus fumigatus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| M220 | Asp f3 Apspergillus fumigatus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| M221 | Asp f4 Apspergillus fumigatus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| M222 | Asp f6 Apspergillus fumigatus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| 598 | ASPERGILLOSI ANTIGENE | N | € 45,00 | LuMaMeGi | 28 | 77 | EIA | U/mL | | Fino a 0,50 |
| FRDA | ATASSIA DI FRIEDREICH FXN GAA | N | € 180,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | Repeats Expansion | | | < 0,1<br>DNA genomico estratto da sangue periferico ed analizzato per la stima quantitativa della frazione allelica V617F rispetto all'allele wild-type. L'analisi viene effettuata con tecniche di Real-time PCR tramite kit ipsogen® JAK2 MutaQuant® Qiagen® |
| SMA | ATROFIA MUSCOLARE SPINALE SMN1 | N | € 170,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Negativo<br>La tecnica MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) permette di rilevare variazioni del numero di copie (CNV) dei geni SMN1 e SMN2 tramite l'utilizzo dei reagenti SALSA MLPA EK1-FAM e SALSA® MLPA® Probemix P060-B2 SMA Carrier de |
| BAP | BAP (Potenz. Biol. Antiossid.) | N | € 35,00 | LuMaMeGi | 8 | 65 | Spettrofotometria | uMol/L | | Valore ottimale > 2200<br>Borderline 2000 - 2200<br>Stati di carenza:<br>Discreta 1800 - 2000<br>Moderata 1600 - 1800<br>Forte 1400 - 1600<br>Fortissima < 1400 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBI | BARBITURICI EMATICI | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | EMIT | ug/mL | 90.09.3 | Fino a 3,00 |
| BCRAB | BCR/ABL 1 t(9;22) QUALITATIVO | N | € 330,00 | LuMaMeGiVe | 15 | | PCR | | 90.80.1 | Un risultato negativo implica trascritto di fusione BCR-ABL1 t(9;22) assente o inferiore al limite di rilevazione della metodica.Per la corretta interpretazione clinica dell'esito del test se ne consiglia la valutazione con lo specialista richiedente. |
| BCR | BCR/ABL t(9-22) PHILADELPHIA | N | € 300,00 | LuMaMeGiVe | 21 | | PCR | | | Assente |
| BENZE | BENZENE EMATICO | N | € 25,00 | LuMaMeGiVe | 11 | | GC MS | ug/L | | < 0,50 |
| BENZU | BENZENE URINE (Fine T.) | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 15 | | GC MS | ug/L | | Popolazione generale < 0,51<br>Fumatori < 4,60<br>Professionalmente esposti < 5,00<br><br>Soggetti professionalmente: esposti non sono reperibili in letteratura valori correlabili con un indice biologico di |
| T215 | Bet v 1 Betula verrucosa | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 109 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| t216 | Bet v 2 Betula verrucosa | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 109 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| B2M | Beta 2 MICROGLOBULINA | N | € 4,35 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 10 | Nefelometrico | mg/L | 90.10.1 | Adulti: 1,09 - 2,53<br>Bambini: 0,90 - 3,00 |
| B2MU | BETA 2 MICROGLOBULINA URINE | N | € 4,35 | Ma | 0 | 224 | Turbidimetria | mg/L | 90.10.1 | 0,030 - 0,200 |
| BETAF | BETA FIBRINOGENO MUT. G455A | N | € 120,00 | MaGi | 9 | | Dot Blot | | | La sostituzione della base guanina -455 con adenina (mutazione G-455A) nel promotore del gene è stata associata ad elevati livelli plasmatici di fibrinogeno. Van't Hooft 1999 Arterioscler Thromb Vasc Biol 19, 3063. Analisi eseguita mediante estrazione de |
| BCGV | BETA-HCG | S | € 3,55 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 7 | CLIA | mU/mL | 90.27.5 | Uomo: < 2,5<br>Donna: In Gravidanza (periodo di amenorrea):<br>5° settimana 20 - 2000<br>6° settimana 500 - 20000<br>7° - 8° settimana 1000 - 100000<br>2° trimestre 4000 - 250000<br>3° trimestre 2000 - 70000<br><br>Non in g<br>Bambini: < 2,5 |
| BCG | BETA-HCG | S | € 3,55 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | CLIA | mU/mL | 90.27.5 | Uomo: < 2,5<br>Donna: In Gravidanza (periodo di amenorrea):<br>5° settimana 20 - 2000<br>6° settimana 500 - 20000<br>7° - 8° settimana 1000 - 100000<br>2° trimestre 4000 - 250000<br>3° trimestre 2000 - 70000<br><br>Non in g<br>Bambini: < 2,5 |
| TAL | BETA-TALASSEMIA 23 Mutazioni | N | € 220,00 | MaGi | 13 | | PCR | | | Negativo<br><br>Mutazioni investigate: -101 (C->T), IVS-I-5 (G->C), -92 (C->T), IVS-I-6 (T->C), -87 (C->A), IVS-I-110 (G->A), -87 (C->G), IVS-I-116 (T->G), Coddon 1 (-G); GTG(Val)->-TG, IVS-I-130 (G->C); TTAG'GCTG->TTAC GCTG, Codon 5 (-CT); CCT(Pro)->C--, C |
| BIC | BICARBONATO | N | € 0,95 | LuMaMeGiVe | 1 | 6 | Spettrofotometria | mMol/L | 90.10.2 | 21,0 - 28,0 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIF | BILIRUBINA FRAZIONATA | S | € 1,05 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 4 | Colorimetrico | | 90.10.5 | |
| BIT | BILIRUBINA TOTALE | S | € 3,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | Colorimetrico | mg/dL | 90.10.4 | Fino a 1,20 |
| 10015 | BIOPSIA CAVO ORALE | N | € 151,30 | LuMaMeGiVe | 17 | | Microscopia digitale | | 91.40.D | |
| 10016 | BIOPSIA CAVO ORALE ESCISSIONE | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.40.D | |
| 10021 | BIOPSIA CERVICE UTERINA | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10094 | BIOPSIA CUNEIFORME LINGUA | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10044 | BIOPSIA CUTE (ESCISSIONE) | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10042 | BIOPSIA CUTE (PUNCH) | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10032 | BIOPSIA ENDOSCOPICA DIGERENTE | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10093 | BIOPSIA LINGUA | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10049 | BIOPSIA POLIPECTOMIA DIGERENTE | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| BITE | BITEST | N | € 10,50 | LuGi | 3 | 97 | Immunometrico | | 90.27.4 | |
| POLIV | BK POLIOMA VIRUS SANGUE | N | € 105,00 | MeVe | 21 | | PCR | | | Negativo |
| POLIU | BK POLIOMA VIRUS URINE SPOT | N | € 105,00 | MeVe | 21 | | PCR | | | Negativo |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP | BNP | N | € 11,90 | LuMaMeGiVe | 1 | 7 | CLIA | pg/mL | 90.36.6 | Uomo: Fino a 54 anni < 33<br>55 - 64 anni < 39<br>65 - 74 anni < 67<br>> 75 anni < 121<br>Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As<br>Donna: Fino a 54 anni < 57<br>55 - 64 anni < 75<br>65 - 74 anni < 75<br>> 75 anni < 167<br>Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As<br>Bambino: Fino a 54 anni < 33<br>55 - 64 anni < 39<br>65 - 74 anni < 67<br>> 75 < 121<br>Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As<br>Bambina: Fino a 54 anni < 57<br>55 - 64 anni < 75<br>65 - 74 anni < 75<br>> 75 < 167<br>Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As |
| BORPC | BORDETELLA PERTUSSIS DNA | N | € 100,00 | MaGi | 11 | | PCR | | | Negativo |
| F76M | Bos d 4 Bos spp Alfa Lattalb. | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 152 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| F77M | Bos d 5 Bos spp Beta Lattoglob | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 152 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| E204 | Bos d 6 Bos spp BSA Albumina | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| F78M | Bos d 8 Bos spp Caseina | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 125 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| BRCAN | BRCA 1+2 NGS | N | € 550,00 | MaGiSa | 15 | | Next Generation Sequencing | | | |
| BREAS | BREAST SCREENING | N | € 850,00 | LuMe | 33 | | Next Generation Sequencing | | | |
| BROTT | BREATH TEST ACIDO OTTANOICO | N | € 120,00 | LuMaMeGiVe | 11 | | Breath Test | | | |
| BRGLU | BREATH TEST GLUCOSIO | N | € 84,00 | LuMaMeGiVeSa | 14 | | Breath Test | | | |
| BRLAT | BREATH TEST LATTOSIO | N | € 84,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 20 | Breath Test | | | |
| BRLEV | BREATH TEST LATTULOSIO | N | € 135,00 | LuMaMeGiVeSa | 14 | | Breath Test | | | |
| CPT | C PEPTIDE | N | € 2,60 | LuMaMeGiVe | 2 | 27 | CLIA | ng/mL | 90.11.1 | 0,78 - 5,19 |
| C1 | C1 INIBITORE | N | € 5,75 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 10 | Nefelometrico | mg/L | 90.60.1 | 210 - 390 |
| C1Q | C1Q | N | € 3,20 | LuMaMeGiVe | 3 | 53 | Nefelometrico | mg/L | 90.60.2 | 100 - 250 |
| C3 | C3 | N | € 3,20 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 8 | Nefelometrico | mg/dL | 90.60.2 | 90,0 - 180,0 |
| C3PRO | C3 PROATTIVATORE | N | € 3,20 | LuMaMeGiVe | 4 | 54 | Nefelometrico | mg/dL | 90.60.2 | 10,0 - 45,0 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | C4 | N | € 3,20 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 8 | Nefelometrico | mg/dL | 90.60.2 | 10,0 - 40,0 |
| C12 | CA 125 | S | € 13,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | U/mL | 90.55.1 | Fino a 35,0 |
| C15 | CA 15.3 | S | € 6,80 | LuMaMeGiVe | 1 | 7 | CLIA | U/mL | 90.55.2 | Fino a 30,0 |
| C19 | CA 19.9 | S | € 6,90 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 9 | CLIA | U/mL | 90.55.3 | Fino a 37,0 |
| C95 | CA 195 | N | € 40,00 | LuMe | 10 | | RIA | U/mL | 90.55.4 | Fino a 9,0 |
| C50 | CA 50 | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 4 | 96 | CLIA | U/mL | 90.55.5 | Fino a 25,0 |
| C54 | CA 54.9 | N | € 36,00 | LuMe | 10 | | RIA | U/mL | | Fino a 10,0 |
| C72 | CA 72.4 | N | € 35,00 | LuMaMeGiVe | 3 | 66 | CLIA | U/mL | 90.56.1 | < 6,00 |
| CDEM | CADMIO EMATICO | N | € 26,00 | LuMe | 10 | | Assorbimento Atomico | | | |
| CDU | CADMIO URINE SPOT | N | € 26,00 | LuMe | 10 | | Assorbimento Atomico | ug/g creat | | < 5,0 |
| CACOR | CALCEMIA CORRETTA (PAYNE) | N | € 0,00 | LuMaMeGiVe | 2 | | Calcolato Matematicamente | | | |
| CAIA | CALCIEMIA CORRETTA | N | € 13,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | | Payne | mg/dL | | 4,25 - 5,25 |
| CA | CALCIO | S | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Arsenazo | mg/dL | 90.11.4 | Adulti: 8,50 - 10,50<br>Bambino: 8,50 - 11,00<br>Bambina: 8,80 - 11,00 |
| CAI | CALCIO IONIZZATO | N | € 28,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 26 | ISE | mMol/L | | 1,15 - 1,33<br>Test eseguito con determinazione diretta ISE del calcio ionizzato. Report in letteraratura suggeriscono che l'utilizzo di metodiche di calcolo del calcio ionizzato possono portare a una classificazione errata del paziente (Desgagné, et al. |
| CAU | CALCIO URINE | S | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 2 | 44 | Arsenazo | mg/24h | 90.11.4 | |
| CAUSP | CALCIO URINE SPOT | S | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 2 | 45 | Arsenazo | | 90.11.4 | |
| CT | CALCITONINA | S | € 12,35 | LuMaMeGiVe | 2 | 7 | CLIA 2° generazione | pg/mL | 90.11.5 | Uomo: Fino a 18,0<br>Donna: Fino a 13,0<br>Bambini: Fino a 10,0 |
| CSA | CALCOLO SALIVARE | N | € 6,35 | LuGi | 10 | | Chimico | | 90.12.1 | |
| CUR | CALCOLO URINARIO | N | € 6,35 | LuMe | 11 | 160 | Chimico | | 90.12.1 | |
| CALPR | CALPROTECTINA FECALE | N | € 3,45 | LuMaMeGiVeSa | 8 | 62 | CLIA | mg/kg feci | 90.12.A | 1 - 50 |
| CALPP | CALPROTECTINA PLASMATICA | N | € 3,45 | Ve | 7 | | EIA 2° generazione | ug/mL | 90.21.4 | 0,3 - 1,6<br>I livelli plasmatici di calprotectina sono correlati ai processi infiammatori quali, ad esempio, le atriti reumatoidi, le reazioni acute, nelle cirrosi etc. |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALRE | CALRETICULINA ESONE 9 QUALIT. | N | € 290,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | PCR | | | Negativo<br>Determinazione qualitativa delle varianti p.(L367fs*46) anche nota come tipo 1, e p.(K385fs*47) anche nota come tipo 2, nell'esone 9 del gene CALR mediante tecnica Real-Time PCR.<br>Sensibilità analitica: 0,025 ng di DNA < 1%<br>Riproducibilità: |
| CANDI | Candida albicans DNA | N | € 48,00 | MaGi | 7 | | PCR | | | |
| CANDI | Candida albicans DNA | N | € 48,00 | MaGi | 7 | | PCR | | | Negativo |
| CANDI | CANDIDA ALCICANS DNA | N | € 48,00 | LuGi | 11 | | PCR | | | |
| CANDI | CANDIDA ALCICANS DNA | N | € 48,00 | LuGi | 11 | | PCR | | | Negativo |
| 433 | CANDIDA ANTIGENE MANNANO | N | € 35,00 | LuMaMeGi | 12 | | EIA | pg/mL | | < 62,5 |
| THCPI | CANNABINOIDI MATRICE CHERATIN. | N | € 180,00 | LuMe | 15 | | EIA | | | Ricerca dei metaboliti dei cannabinoidi su pamtrice pilifera. Un risultato negativo indica una concentrazione del metabolita inferiore al cut-off di riferimento. |
| CF | CAPACITA' FERRO LEGANTE | S | € 1,70 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 44 | Calcolato Matematicamente | mg/dL | 90.42.4 | 250 - 450 |
| CAR | CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) | N | € 24,00 | LuMaMeGiVe | 3 | 68 | CLIA | ug/mL | 90.12.3 | Intervallo terapeutico 4,0 - 10,0<br>Livello tossico > 12,0 |
| CAROX | CARBAZEPINA MONOIDROSSI TOLEP | N | € 24,00 | LuMaMeGiVe | 9 | | HPLC | | | 13,0 - 30,0 |
| CARBE | CARBOSSIEMOGLOBINA | N | € 20,00 | LuMaMeGiVe | 7 | 74 | Carbossim. | % | | Fino a 3,50 |
| MC | CARIOTIPO | N | € 170,00 | LuGi | 35 | | | | 91.30.4 | Uomo: 46,XY<br>Donna: 46,XX<br>Bambino: 46,XY<br>Bambina: 46,XX |
| CARAB | CARIOTIPO (Su Materiale Ab.) | N | € 430,00 | LuMe | 35 | | | | 91.30.4 | |
| CARAM | CARIOTIPO MOLECOLARE (Mat.Ab.) | N | € 840,00 | LuMe | 18 | | | | 91.30.4 | |
| MCCGH | CARIOTIPO Molecolare aCGH | N | € 820,00 | LuGi | 35 | | | | 91.30.4 | Uomo: 46,XY<br>Donna: 46,XX<br>Bambino: 46,XY<br>Bambina: 46,XX |
| T209 | Carpinus betulus | N | € 7,50 | LuMe | 7 | | IMMUNOCAP | IU/mL | | 0,00 - 0,35 |
| F64 | Castagne | N | € 7,20 | LuMaMeGi | 6 | | IMMUNOCAP | IU/mL | | 0,00 - 0,35 |
| CA3 | CATECOLAMMINE PLASMATICHE | N | € 70,00 | LuMaMeGiVe | 7 | 159 | HPLC | ng/L | 90.12.4 | |
| CAF | CATECOLAMMINE URINARIE FRAZ. | N | € 55,00 | LuGi | 13 | | HPLC | ug/24h | 90.12.4 | |
| BJS | CATENE LEGGERE LIBERE SIERICHE | N | € 19,75 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 27 | Nefelometrico | | 90.28.7 | |
| BJQ | CATENE LEGGERE LIBERE URINE | N | € 19,75 | LuGi | 4 | 38 | Nefelometrico | | 90.28.7 | |
| CDKN2 | CDKN2A (P16) | N | € 480,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Negativo |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA | CEA | S | € 6,20 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | ng/mL | 90.56.3 | 0 - 4,00 |
| CTC | CELLSEARCH CTC TEST VERIDEX | N | € 590,00 | Lu | 17 | | Veridex | CTC/7,5 ml | | |
| CER | CERULOPLASMINA | N | € 4,00 | LuMe | 6 | 64 | Immunoturbidimetrico | mg/dL | 90.12.5 | 15 - 45 |
| CHIFE | CHIMOTRIPSINA FECALE | N | € 5,75 | LuMe | 8 | | Enzimatico | U/gr 37° | 90.13.1 | Normale > 13,2<br>Bordeline 6,6 - 13,1<br>Patologico < 6,5 |
| CLPD | CHLAMYDIA PNEUMONIAE DNA | N | € 75,00 | LuGi | 12 | | Realtime PCR | | | |
| CLD | CHLAMYDIA TRACOMATIS DNA | N | € 32,00 | MaGi | 9 | 69 | Realtime PCR | | 90.90.3 | |
| CLDLS | CHLAMYDIA TRACOMATIS DNA | N | € 32,00 | MaGi | 9 | | Realtime PCR | | 90.90.3 | |
| CIC | CICLOSPORINA | N | € 28,00 | LuGi | 3 | 93 | CLIA | ng/mL | 90.13.2 | Non esistono range terapeutici consolidati per il dosaggio della Ciclosporina su sangue intero. La complessità dello stato clinico, le singole differenze nella sensibilutà agli effetti immunosoppressivi e nefrotossici della Ciclosporina, la somministrazio |
| CIC2 | CICLOSPORINA dopo farmaco | N | € 28,00 | LuGi | 3 | 110 | CLIA | ng/mL | 90.13.2 | |
| CISTA | CISTATINA C | N | € 45,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 70 | Nefelometrico | mg/L | | Adulti: 0,64 - 1,23<br>Bambini: 0,56 - 0,95 |
| CIS | CISTINURIA | N | € 100,00 | LuMe | 19 | | Cromatografia Ionica | mcM | | |
| C2P19 | Citocromo CYP2C19 Alleli | N | € 250,00 | LuMaMeGiVe | 18 | | PCR | | | *15/*15 |
| CY2D6 | Citocromo P450 2D6 Alleli | N | € 250,00 | MaGi | 18 | | PCR | | | 1* |
| CITAG | CITOLOGA AGOASPIRATO | N | € 151,30 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.48.3 | |
| CITOL | CITOLOGIA | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| CITL | CITOLOGIA FASE LIQUIDA | N | € 17,00 | LuMaMeGiVe | 8 | | | | 91.38.5 | |
| CIT | CITOLOGIA URINE | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10278 | CITOLOGIA URINE (1° Camp.) | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10279 | CITOLOGIA URINE (2° Camp.) | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10280 | CITOLOGIA URINE (3° Camp.) | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| ACC | CITRATO URINE | N | € 8,35 | LuMaMeGiVe | 8 | 76 | Enzimatico UV | mMol/24h | 90.02.2 | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKM | CK-MB | N | € 12,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 21 | ELFA 2° generazione | ng/mL | 90.15.5 | Fino a 5,0 |
| CCU | CLEARANCE ACIDO URICO | N | € 1,05 | LuMaMeGiVeSa | 3 | | Enzimatico Colorimetrico | mL/min | 90.43.5 | |
| CCR | CLEARANCE CREATININA (GFR) | N | € 1,90 | LuMaMeGiVe | 2 | 43 | Enzimatico UV | | 90.16.4 | |
| CCF | CLEARANCE FOSFORO | N | € 12,00 | LuMaMeGiVe | 2 | | Spettrofotometria UV | | 90.24.5 | |
| UCL | CLEARANCE UREA | N | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 3 | 5 | Ureasi UV | mL/min | 90.44.1 | |
| 693 | CLOBAZAM | N | € 42,00 | | 10 | 194 | HPLC | ng/mL | | 50,0 - 700,0 |
| 689 | CLONAZEPAM | N | € 42,00 | LuMaMeGiVe | 10 | 194 | HPLC | ng/mL | | Uomo: 50,0 - 700<br>Donna: 50,0 - 700,0<br>Bambini: 50,0 - 700,0 |
| CL | CLORO | S | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | ISE | mMol/L | 90.13.3 | 98 - 110 |
| CLU | CLORO URINE | N | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 29 | ISE | mEq/24h | 90.13.3 | |
| CLUSP | CLORO URINE SPOT | N | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 2 | 76 | ISE | mEq/L | 90.13.3 | 70 - 160 |
| GDH | CLOSTRIDIUM DIFF. ANTIGENE GDH | N | € 3,45 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Immunocromatografico | | 90.21.4 | Negativo |
| CLTOX | CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANTIGENI | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 1 | 12 | Immunometrico | | 90.91.1 | |
| CLDNA | CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA | N | € 100,00 | LuMaMeGiVe | 1 | | Immunometrico | | 90.91.1 | |
| 1576 | CLOZAPINA | N | € 60,00 | | 10 | 164 | HPLC | ng/mL | | 50,0 - 700,0 |
| CMS | CMV DNA QUANTITATIVO (Sangue) | S | € 44,30 | LuGi | 9 | | PCR | Copie/ml | 91.15.2 | Non dosabile < 50<br>Esame eseguito mediante amplificazione specificifa e rivelazione Real Time della regione IE (Major Immediate Early Protein) del genoma virale CMV su AB 7300. Limite inferiore di sensibilità 50 copie/ml. |
| CMU | CMV DNA QUANTITATIVO (Urine) | S | € 55,00 | LuGi | 10 | | PCR | Copie/ml | 91.15.5 | Non dosabile < 50<br>Esame eseguito mediante amplificazione specificifa e rivelazione Real Time della regione IE (Major Immediate Early Protein) del genoma virale CMV su AB 7300. Limite inferiore di sensibilità 50 copie/ml. |
| COBA | COBALTO | N | € 36,00 | LuMaMeGi | 9 | | Assorbimento Atomico | ug/mL | | Fino a 1,0 |
| 1585 | COENZIMA Q10 | N | € 13,75 | LuMaMeGiVe | 10 | | LC MSMS | ug/L | 90.45.1 | 750 - 1000 |
| HDL | COLESTEROLO HDL | N | € 1,80 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Eliminazione Diretta | mg/dL | 90.14.1 | Uomo: Valori desiderabili > 40<br>Donna: Valori desiderabili > 45<br>Bambini: Valori desiderabili > 45 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | COLESTEROLO LDL | N | € 6,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Eliminazione Diretta | mg/dL | 90.13.C | Adulti: Valori desiderabili < 115<br>Valori al limite 115 - 130<br>Valori alti 130 - 190<br>Valori molto alti > 190<br>Bambini: Valori desiderabili < 110<br>Valori al limite 115 - 130<br>Valori alti 130 - 190<br>Valori molto alti > 190 |
| LDOSS | COLESTEROLO LDL OSSIDATO | N | € 60,00 | LuMaMeGiVe | 20 | 109 | EIA | ng/mL | | < 133,2 |
| CO | COLESTEROLO TOTALE | S | € 1,20 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Enzimatico | mg/dL | 90.14.3 | Adulti: Valori desiderabili Fino a 190<br>Valori aumentati > 210<br>I valori desiderabili per soggetti con rischio cardiovascolare possono essere sensibilmente più bassi.<br>Bambini: Fino a 190 |
| VLDL | COLESTEROLO VLDL | N | € 10,00 | LuMe | 3 | | Calcolato Matematicamente | mg/dL | | Fino a 50 |
| COL | COLINESTERASI | N | € 13,50 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | Cinetico | U/L | 90.14.4 | Adulti: 6800 - 17600<br>Bambini: 6000 - 17600 |
| COSCR | COLONSCREEN GENETICO 13 MUT. | N | € 1120,00 | LuMaMeGi | 35 | | Next Generation Sequencing | | | |
| XBP | COLTURALE BALANO-PREPUZIALE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 61 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XLING | COLTURALE LINGUALE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 64 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XND | COLTURALE NARICE Dx | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 51 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XNS | COLTURALE NARICE Sx | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 49 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XPIAG | COLTURALE PIAGA | S | € 21,95 | LuMaMeGiVeSa | 5 | 61 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XAR | COLTURALE AURICOLARE Dx | N | € 13,05 | LuMaMeGiVe | 4 | 69 | Colturale | | 90.93.8 | |
| XAS | COLTURALE AURICOLARE Sx | N | € 13,05 | LuMaMeGiVe | 4 | 71 | Colturale | | 90.93.8 | |
| XCERV | COLTURALE CERVICE UTERINA | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 61 | Colturale | | 90.93.3 | |
| ZSD | COLTURALE CONIUNTIVALE Dx | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 63 | Colturale | | 90.93.3 | |
| ZSL | COLTURALE CONIUNTIVALE Sx | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 64 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XCUO | COLTURALE CUOIO CAPELLUTO | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 8 | 54 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XCU | COLTURALE CUTE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 7 | 59 | Colturale | | 90.93.3 | |
| COPS | COLTURALE ENTEROPATOGENI | N | € 35,00 | LuMaMeGi | 3 | 58 | Colturale | | 91.27.4 | |
| ESP | COLTURALE ESPETTORATO | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 5 | 60 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XTF | COLTURALE FARINGEO | S | € 21,20 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 55 | Colturale | | 90.93.5 | Negativo |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCO | COLTURALE FECI | S | € 18,35 | LuMaMeGiVeSa | 4 | 56 | Colturale | | 90.94.3 | |
| XGENG | COLTURALE GENGIVALE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 0 | | Colturale | | 90.93.3 | |
| XSP | COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 55 | Colturale | | 90.93.4 | |
| XCM | COLTURALE MICETI FECALI | N | € 24,00 | LuMaMeGiVeSa | 4 | 67 | Colturale | | 90.98.5 | Negativo |
| GE1 | COLTURALE MYCOPLASMI | N | € 11,65 | LuMaMeGiVe | 4 | 60 | Colt. Bioch. | | 91.02.A | |
| XTR | COLTURALE RETTALE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 59 | Colturale | | 90.93.3 | |
| EMOCO | COLTURALE SANGUE E ATB | N | € 25,95 | LuMaMeGiVe | 11 | 173 | Colturale | | 90.94.1 | |
| XSU | COLTURALE SECRETO URETRALE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | | Colturale | | 90.93.3 | |
| XTS | COLTURALE STREPTOCOCCO | S | € 21,20 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 49 | Colt. Imm. | | 90.93.5 | |
| UNG | COLTURALE UNGHIA E ATB | S | € 15,70 | LuMaMeGiVe | 10 | 138 | Colturale | | 90.98.4 | |
| XTU | COLTURALE URETRALE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 56 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XUR | COLTURALE URINE | S | € 16,40 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 39 | Colturale | | 90.94.2 | |
| XURV | COLTURALE URINE | S | € 16,40 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 38 | Colturale | | 90.94.2 | |
| XTV | COLTURALE VAGINALE | S | € 21,95 | LuMaMeGiVe | 4 | 57 | Colturale | | 90.93.3 | |
| XVU | COLTURALE VULVARE | S | € 26,00 | LuMaMeGiVe | 4 | 63 | Colturale | | 90.93.4 | |
| CH100 | COMPLEMENTO TOTALE (CH 100) | N | € 52,00 | LuMe | 9 | | RID | U/mL | | 488 - 1150 |
| ADD | CONTA CELLULE URINARIE | N | € 16,00 | MaVe | 2 | 124 | Microscopia digitale | | 90.44.2 | |
| STERI | CONTROLLO STERILIZZAZIONE | N | € 30,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 72 | Colt. Bioch. | | | |
| 2157 | COPEPTINA ProAVP | N | € 97,00 | LuMaMeGiVe | 0 | | TRACE | pMol/L | | 2,6 - 21,4<br>< 2,6 In pazienti con privazione di liquidi indicativo di diabete insipido centrale.<br>> 21,4 In pazienti senza privazione di liquidi indicativo di diabete insipido nefrogenico. |
| f439 | Cor a 14 Corylus avellana | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f425 | Cor a 8 Corylus avellana | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f440 | Cor a 9 Corylus avellana | N | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| 418 | CORTISOL BINDING GLOBULIN | N | € 80,00 | LuMaMeGi | 15 | | RIA | ug/mL | | 40 - 60 |
| COR | CORTISOLO | S | € 10,35 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 5 | CLIA | ng/mL | 90.15.3 | 60 - 240 |
| CORSA | CORTISOLO SALIVARE | N | € 30,00 | LuMaMeGi | 7 | | EIA | ng/mL | | Ore 8 3,0 - 10,0<br>Ore 23 0,6 - 2,50 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORS2 | CORTISOLO SALIVARE (2 Camp.) | N | € 64,00 | LuMaMeGiVe | 10 | | EIA | | | |
| CORS3 | CORTISOLO SALIVARE (3 Camp.) | N | € 90,00 | LuMaMeGiVe | 10 | | EIA | | | |
| CORS4 | CORTISOLO SALIVARE (4 Camp.) | N | € 128,00 | LuMaMeGiVe | 0 | | EIA | | | |
| COU | CORTISOLO URINE | S | € 10,35 | LuMaMeGiVe | 3 | 51 | CLIA | ug/24h | 90.15.3 | 20,9 - 292,3 |
| COUSP | CORTISOLO URINE SPOT | S | € 10,35 | LuMaMeGiVe | 3 | | CLIA | ug/L | 90.15.3 | 20,9 - 292,3 |
| 6310 | COTININA (Metabolita nicotina) | N | € 33,00 | LuMaMeGi | 28 | | EIA | ng/mL | | Fino a 25,0 |
| CPK | CPK | N | € 1,75 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | Cinetico | U/L | 90.15.4 | Uomo: Fino a 200<br>Donna: Fino a 170<br>Bambini: Neonati 120 - 500<br>Fino a 1 anno 120 - 350<br>Da 1 a 5 anni 120 - 280<br>Adulti 120 - 246<br>I valori di riferimento in età pediatrica sono indicativi. |
| CRE | CREATININA | S | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Enzimatico UV | mg/dL | 90.16.3 | Uomo: 0,67 - 1,17<br>11 - 13 anni 0,44 - 0,68<br>13 - 15 anni 0,46 - 0,77<br>15 - 40 anni 0,67 - 1,17<br>> 40 anni 0,78 - 1,37<br>Donna: 0,51 - 0,95<br>11 - 13 anni 0,44 - 0,68<br>13 - 15 anni 0,46 - 0,77<br>15 - 40 anni 0,51 - 0,95<br>> 40 anni 0,51 - 1,14<br>Bambini: 0 - 2 mesi 0,31 - 0,88<br>2 - 12 mesi 0,16 - 0,39<br>1 - 3 anni 0,18 - 0,35<br>3 - 5 anni 0,26 - 0,42<br>5 - 7 anni 0,29 - 0,47<br>7 - 9 anni |
| CRU | CREATININA URINE | S | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 2 | 29 | Enzimatico UV | mg/24h | 90.16.3 | Uomo: 800 - 1800<br>Valori di creatinuria delle 24h aumentati sono generalmente riferibili ad attività sportiva con aumento della massa muscolare oppure a raccolte delle urine delle 24h errate (doppia raccolta delle minzioni del risveglio).<br>Donna: 600 - 1600<br>Valori di creatinuria delle 24h aumentati sono generalmente riferibili a raccolte delle urine delle 24h errate (doppia raccolta delle minzioni del risveglio).<br>Bambini: 200 - 1200<br>Valori di creatinuria delle 24h aumentati sono generalmente riferibili a raccolte delle urine delle 24h errate (doppia raccolta delle minzioni del risveglio). |
| CRUSP | CREATININA URINE SPOT | S | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 2 | 13 | Enzimatico UV | mg/dL | 90.16.3 | Adulti: 50 - 300<br>Bambini: 30 - 200 |
| CRICA | CRIOGLOBULINE (Caratterizzaz.) | N | € 12,80 | MeVe | 14 | | Elettroforetico | | 90.61.2 | |
| CRI | CRIOGLOBULINE (Screeening) | N | € 1,55 | LuMaMeGiVeSa | 8 | 147 | Precipitazione | | 90.61.1 | Negativo |
| CROMO | CROMO | N | € 6,90 | LuMaMeGi | 8 | | Assorbimento Atomico | ug/L | 90.16.5 | Fino a 1,00 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMU | CROMO URINE SPOT | N | € 30,00 | LuMe | 10 | | Assorbimento Atomico | ug/g creat | | |
| PIRI | CROSSLINK DI PIRIDINIO | N | € 50,00 | LuMe | 10 | 199 | HPLC | | | |
| CRYAG | CRYPTOCOCCO NEOFORMANS Ag | N | € 45,00 | LuMaMeGi | 14 | | Agglutinazione | Titolo | | < 1:2 |
| 6199 | Cryptosporidium Ag FECALE | N | € 18,00 | LuMaMeGi | 15 | | Immunocromatografico | | | Negativo |
| CTX | CTX COLLAGENE I (CROSSLAPS) | N | € 55,00 | LuMe | 5 | 69 | CLIA | pg/mL | 90.41.6 | Uomo: Fino a 800,0<br>In menopausa fino a 1200,0<br>Donna: Fino a 800,0<br>In menopausa fino a 1200,0 |
| T226 | Cup a1 Cupressus arizonica | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 196 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| FE3 | CURVA DA CARICO DEL FERRO | N | € 1,15 | LuMaMeGiVeSa | 3 | | Ferrozine | ug/24h | 90.22.5 | |
| FSHGN | CURVA DI FSH DOPO GNRH | N | € 23,25 | LuMaMeGiVeSa | 3 | | CLIA | mIU/mL | 90.32.4 | |
| LHGN | CURVA DI LH DOPO GNRH | N | € 23,25 | LuMaMeGiVeSa | 3 | | CLIA | mIU/mL | 90.32.4 | |
| CG2V | CURVA GLICEMICA (2 Pr.) | S | € 9,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CG3V | CURVA GLICEMICA (3 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.4 | |
| CG4V | CURVA GLICEMICA (4 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CG5 | CURVA GLICEMICA (5 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 45 | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CG5V | CURVA GLICEMICA (5 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CG6V | CURVA GLICEMICA (6 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CG7V | CURVA GLICEMICA (7 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CG7 | CURVA GLICEMICA (7 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CG8V | CURVA GLICEMICA (8 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CG8 | CURVA GLICEMICA (8 Pr.) | S | € 3,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| GU6 | CURVA GLUCAGONE (6 Pr.) | N | € 3,80 | LuMaMeGiVe | 25 | | Enzimatico | g/L | 90.26.5 | |
| CIN2 | CURVA INSULINEMICA (2 Pr.) | S | € 26,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 57 | CLIA | uU/mL | 90.28.5 | |
| CIN3 | CURVA INSULINEMICA (3 Pr.) | S | € 26,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 70 | CLIA | uU/mL | 90.28.5 | |
| CIN4 | CURVA INSULINEMICA (4 Pr.) | S | € 26,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 41 | CLIA | uU/mL | 90.28.5 | |
| CIN5 | CURVA INSULINEMICA (5 Pr.) | S | € 26,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 40 | CLIA | uU/mL | 90.28.5 | |
| CIN6 | CURVA INSULINEMICA (6 Pr.) | S | € 26,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | CLIA | uU/mL | 90.28.5 | |
| CIN7 | CURVA INSULINEMICA (7 Pr.) | S | € 5,95 | LuMaMeGiVe | 1 | | CLIA | uU/mL | 90.29.1 | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN8 | CURVA INSULINEMICA (8 Pr.) | S | € 5,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | CLIA | uU/mL | 90.29.1 | | |
| C21 | CYFRA 21-1 | N | € 18,60 | LuMaMeGiVe | 5 | 81 | CLIA | ng/L | 90.61.3 | | Fino a 2,08 |
| D4 | DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | S | € 13,00 | Me | 6 | 83 | CLIA | ng/mL | 90.17.3 | Uomo: Adulti | 0,50 - 3,50 |
| | | | | | | | | | | 7 - 11 anni | 0,07 - 0,74 |
| | | | | | | | | | | 12 - 16 anni | 0,25 - 2,21 |
| | | | | | | | | | | 17 - 21 anni | 0,44 - 2,65 |
| | | | | | | | | | | Donna: In età fertile | 0,40 - 3,40 |
| | | | | | | | | | | Postmenopausa | 0,10 - 2,10 |
| | | | | | | | | | | 7 - 11 anni | 0,12 - 2,41 |
| | | | | | | | | | | 12 - 16 anni | 0,42 - 3,41 |
| | | | | | | | | | | 17 - 21 anni | 0,70 - 4,31 |
| | | | | | | | | | | Bambino: 2 - 6 anni | 0,02 - 0,29 |
| | | | | | | | | | | 7 - 11 anni | 0,07 - 0,74 |
| | | | | | | | | | | 12 - 16 anni | 0,25 - 2,21 |
| | | | | | | | | | | 17 - 21 anni | 0,44 - 2,65 |
| | | | | | | | | | | Bambina: 2 - 6 anni | 0,01 - 0,34 |
| | | | | | | | | | | 7 - 11 anni | 0,12 - 2,41 |
| | | | | | | | | | | 12 - 16 anni | 0,42 - 3,41 |
| | | | | | | | | | | 17 - 21 anni | 0,70 - 4,31 |
| D202 | Der p 1 Dermat. pteronyssinus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 217 | IMMUNOCAP | U/mL | | | < 0,35 |
| D203 | Der p 10 Dermat. pteronyssinus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 128 | IMMUNOCAP | U/mL | | | < 0,35 |
| D205 | Der p 2 Dermat. pteronyssinus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 127 | IMMUNOCAP | U/mL | | | < 0,35 |
| D209 | Der p 23 Dermat. pteronyssinus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 127 | IMMUNOCAP | U/mL | | | < 0,35 |
| DES | DESOSSICORTICOSTEROIDI | N | € 45,00 | LuMe | 9 | | RIA | ng/mL | 90.01.1 | | 0,02 - 0,10 |
| DE | DHEA LIBERO | N | € 25,00 | LuMaMeGi | 5 | 94 | EIA | ng/mL | 90.17.1 | | Uomo: 3,0 - 11,0<br>Donna: 1,0 - 12,0<br>Bambini: 1,0 - 12,0 |
| DEA | DHEA SOLFATO | S | € 13,60 | Me | 2 | 13 | CLIA | ng/mL | 90.17.2 | Uomo: Adulti | 1600 - 3600 |
| | | | | | | | | | | Prepuberale | 100 - 800 |
| | | | | | | | | | | Donna: In età fertile | 800 - 3500 |
| | | | | | | | | | | In menopausa | 100 - 800 |
| | | | | | | | | | | | Bambini: 100 - 800 |
| DAO | DIAMMINOSSIDASI (DAO) | N | € 50,00 | LuMe | 24 | | RIA | U/mL | | Negativo | > 10,0 |
| | | | | | | | | | | Borderline | 3,0 - 9,9 |
| | | | | | | | | | | Deficit di DAO | < 3,0 |
| 1593 | DIAZEPAM | N | € 32,00 | | 10 | 194 | HPLC | ng/mL | | | 50,0 - 700,0 |
| DIG | DIGOSSINA | N | € 18,00 | LuGi | 4 | 124 | CLIA | ng/mL | 90.21.1 | | 0,5 - 2,0 |
| DHT | DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | S | € 21,90 | LuGi | 9 | 129 | EIA | pg/mL | 90.17.5 | Uomo: Fino a 14 anni | 5,0 - 110,0 |
| | | | | | | | | | | Adulti | 250,0 - 990,0 |
| | | | | | | | | | | Donna: Fino a 14 anni | 5,0 - 110,0 |
| | | | | | | | | | | Premenopausa | 24,0 - 596,0 |
| | | | | | | | | | | Postmenopausa | 10,0 - 431,0 |
| | | | | | | | | | | | Bambini: 5,0 - 110,0 |
| DIMER | DIMERO D | N | € 4,40 | LuMaMeGiVe | 4 | 9 | Coagulometrico | ug/L | 90.61.4 | | < 500 |
| DISBI | DISBIOSI INTESTINALE | N | € 50,00 | MaVe | 13 | 145 | HPLC | | | | |
| DM | DISTROFIA MUSCOLARE DMD/DMB | N | € 140,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | | Negativo |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIU12 | Diuresi delle 12 h | N | € 0,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | | | | | Adulti: 300 - 1300<br>Bambini: 200 - 800 |
| HC2 | DNA PAP HPV-HC2 | N | € 120,00 | LuMaMeGiVe | 21 | | | | | Il test esegue la ricerca dei ceppi di HPV a medio ed elevato rischio di trasformazione(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ,68). |
| DOP | DOPAMINA | N | € 35,00 | LuMe | 8 | | HPLC | pg/mL | 90.18.1 | Fino a 52 |
| DPYD | DPYD G>A Met. fluoropirim. | N | € 190,00 | LuMaMeGiVe | 17 | | SANGE | | 90.64.3 | |
| DPYDN | DPYD NGS Met. fluoropirim. | N | € 3,55 | LuMaMeGiVe | 35 | | Next Generation Sequencing | | 90.64.3 | |
| EBVPC | EBV DNA QUANTITATIVO SANGUE | N | € 140,00 | MaGi | 10 | | PCR | IU/mL | | Dosaggio effettuato mediante utilizzo di NeuMoDx 96 Molecular Systems (CE IVD) con amplificazione genica Real Time PCR del genoma EBV. Limite inferiore di sensibilità della metodica pari a 2,3 UI/mL. |
| EBVTA | EBV DNA TAMPONE | N | € 140,00 | MaGi | 10 | | PCR | | | Dosaggio effettuato mediante utilizzo di NeuMoDx 96 Molecular Systems (CE IVD) con amplificazione genica Real Time PCR del genoma EBV. Limite inferiore di sensibilità della metodica pari a 2,3 UI/mL. |
| 1936 | EDOXABAN (LIXIANA) | N | € 150,00 | LuMaMeGiVe | 3 | 53 | Cromogenico | mg/L | | Per dosaggio 60 mg/die<br>Picco 120 - 240<br>Valle 10 - 40<br><br>Per dosaggio 30 mg/die<br>Picco 55 - 115<br>Valle 10 - 20 |
| A841 | EGFR MUTAZIONI | N | € 450,00 | LuMaMeGiVe | 40 | | Next Generation Sequencing | | | Negativo |
| ELAS | ELASTASI FECALE | N | € 55,00 | LuMaMeGi | 15 | 92 | EIA | ug/gr feci | | > 200 |
| QP | ELETTROFORESI PROTEICA | S | € 5,10 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | Elettroforesi Capillare | | 90.38.4 | |
| QPV | ELETTROFORESI PROTEICA | S | € 5,10 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Elettroforesi Capillare | | 90.38.4 | |
| EPU | ELETTROFORESI PROTEINE URINE | N | € 4,95 | LuMaMeGiVe | 3 | 122 | Elettroforetico | | 90.39.1 | Un esito negativo indica la sostanziale assenza di migrazione elettroforetica a seguito di concentrazione del campione urinario e successiva separazione in elettroforesi capillare. |
| AGG | EMOAGGLUTININE A FREDDO | N | € 7,40 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 53 | Agglutinazione | | 90.46.3 | Assenti |
| EMOCE | EMOCROMATOSI DNA 18 Mutazioni | N | € 480,00 | LuGi | 14 | | Dot Blot | | | |
| EMOCR | EMOCROMATOSI DNA 3 Mutazioni | N | € 120,00 | LuGi | 14 | | Dot Blot | | | |
| EGA | EMOGASANALISI ARTERIOSA | N | € 3,40 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 19 | Poteziometria/Amperometria | | 89.65.1 | |
| EGV | EMOGASANALISI VENOSA | N | € 3,40 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 11 | Poteziometria/Amperometria | | 89.66 | |
| HBA | EMOGLOBINA GLICATA | S | € 4,70 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 5 | Enzimatico | % | 90.28.1 | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | EMOPESSINA | N | € 15,60 | LuMaMeGiVe | 11 | | RID | mg/dL | 90.18.5 | 50,0 - 115,0 |
| ENTRN | ENTEROVIRUS RNA | N | € 180,00 | LuMaMeGi | 9 | | PCR | | | Negativo |
| EOSFE | EOSINOFILI FECALI | N | € 31,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | | Negativo |
| 034 | EOSINOFILI NASALI | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.B | |
| 644 | ERITROPOIETINA | N | € 15,60 | LuMaMeGiVe | 4 | 72 | CLIA | mU/mL | 90.18.5 | 4,3 - 29,0 |
| AGO | ES. ISTOLOGICO SU LIQ. BIOL. | N | € 151,30 | LuMaMeGiVeSa | 10 | | . | | 91.48.3 | |
| SWELL | ES.LIQUIDO SEMINALE(SWELLING) | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 7 | | Microscopia digitale | | 90.31.4 | |
| FCF | ESAME CHIMICO-FISICO FECI | N | € 13,50 | LuMaMeGiVe | 2 | 17 | Chimico Fisico | | 90.21.3 | |
| UR | ESAME DELLE URINE E SEDIMENTO | S | € 2,55 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 7 | Microscopia digitale - Chimico | | 90.44.3 | |
| LS | ESAME LIQUIDO SEMINALE | N | € 31,00 | LuMaMeGiVe | 7 | 48 | Microscopia digitale | | 90.31.4 | |
| SIN | ESAME LIQUIDO SINOVIALE | N | € 21,20 | LuMaMeGiVe | 10 | | Chimico Fisico | | 90.93.5 | |
| BAT | ESAME MICROSCOPICO | N | € 8,00 | LuMaMeGiVe | 1 | 109 | | | | |
| PAR | ESAME PARASSITOLOGICO FECI | S | € 13,25 | LuMaMeGiVe | 3 | 23 | Microscopia digitale | | 91.04.6 | |
| ESAND | ESANDIONE URINE SPOT | N | € 26,00 | LuMe | 10 | | GC FID | mg/g creat | | 0,01 - 0,5 |
| EST | ESTRADIOLO | S | € 7,50 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA 2° generazione | pg/mL | 90.19.2 | Uomo: 10 - 40<br>Donna: Fase follicolare 30 - 160<br>Picco ovulatorio 150 - 400<br>Fase luteale 60 - 220<br>Postmenopausa 10 - 40<br>Il dosaggio non dovrebbe essere utilizzato in pazienti in trattamento con Faslodex.<br>Bambini: Fino a 40 |
| ESR | ESTRIOLO (E3) | N | € 19,00 | LuMe | 5 | | RIA | pg/mL | 90.19.3 | Uomo: < 4,50<br>Donna: Non in gravidanza 0,63 - 4,56<br>In gravidanza:<br>17 - 20 settimane 5,49 - 25,30<br>21 - 24 settimane 6,73 - 41,14<br>25 - 28 settimane 13,40 - 50,28<br>29 - 32 settimane 17,49 - 54,91<br>33 - 36<br>Bambini: < 4,50 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL | ESTRIOLO LIBERO | N | € 19,00 | LuMe | 5 | | RIA | ng/mL | 90.19.3 | Donna: In gravidanza<br>27° settimana 2,3 - 6,4<br>28° settimana 2,3 - 7,0<br>29° settimana 2,3 - 7,7<br>30° settimana 2,4 - 8,6<br>31° settimana 2,6 - 9,9<br>32° settim |
| EU1 | ESTRIOLO URINE | N | € 12,50 | LuMe | 8 | | RIA | mg/24h | 90.19.3 | Uomo:<br>Donna: Settimana di gestazione:<br>1° - 20° < 5,0<br>21° - 25° 1,7 - 14,9<br>26° - 30° 7,0 - 21,2<br>31° - 35° 8,7 - 25,5<br>36° - 40° 19,2 - 54,4<br>Bambini: |
| ESTRO | ESTROGENI TOTALI | N | € 22,00 | LuMe | 7 | 188 | IRMA | pg/mL | | Uomo: 40 - 115<br>Donna: 1° - 10° g. del ciclo 61 - 394<br>11° - 20° g. del ciclo 122 - 437<br>21° - 28° g. del ciclo 156 - 350<br>In menopausa 0 - 40 |
| ETR | ESTRONE | N | € 17,00 | LuMaMeGi | 10 | 123 | EIA | pg/mL | 90.19.5 | Uomo: 9,0 - 79,0<br>Donna: 14,7 - 136,8<br>Bambini: 9,0 - 79,0 |
| ETAUR | ETANOLO URINE SPOT | N | € 24,00 | LuMe | 5 | | | | | Negativo |
| ETG | ETILGLUCURONIDE URINE SPOT | N | € 65,00 | LuMe | 21 | | Immunochimico | ng/mL | | Cut-off per uso clinico < 500<br>Cut-off per uso medico legale < 1000 |
| ETO | ETOSUCCIMIDE (ZAROTIN) | N | € 24,00 | LuMe | 9 | | TDX | ug/mL | 90.20.2 | 40 - 100 |
| 6340 | EVEROLIMUS | N | € 45,00 | LuMaMeGi | 14 | | ACMIA | ng/mL | | 3,00 - 8,00 |
| F2C | FATTORE II COAGULAZIONE | N | € 3,55 | LuGi | 9 | 84 | Coagulometrico | % | 90.64.3 | 70 - 146 |
| FII | FATTORE II Mutazione G20210A | N | € 125,00 | LuGi | 9 | 196 | Dot Blot | | | Un esito negativo indica assenza della mutazione. La sostituzione della base guanina 20210 con adenina (mutazione G20210A) in regione 3' non codificante è stata associata con un alterato livello plasmatico di protrombina.<br>Analisi eseguita mediante estraz |
| F9C | FATTORE IX COAGULAZIONE | N | € 3,55 | LuMaMeGiVe | 10 | | Coagulometrico | % | 90.64.3 | 70 - 120 |
| RT | FATTORE REUMATOIDE (RF) | S | € 3,85 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 9 | Nefelometrico | U/mL | 90.64.2 | Fino a 20,0 |
| FVM | FATTORE V 3 MUTAZIONI | N | € 180,00 | LuGi | 11 | 200 | PCR Ibridazione inversa | | | |
| FVC | FATTORE V COAGULAZIONE | N | € 3,55 | LuMe | 14 | 118 | Coagulometrico | % | 90.64.3 | 64 - 143 |
| FVL | FATTORE V Mutazione G1691A | N | € 3,55 | LuGi | 14 | 198 | Dot Blot | | 90.64.3 | Un risultato negativo indica assenza della mutazione. La sostituzione della base guanina 1691 con adenina (mutazione G1691A) determina la sostituzione dell'amminoacido arginina con glutamina (R506Q).<br>Esame eseguito mediante estrazione del DNA, amplifica |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVII | FATTORE VII (3 MutazionI) | N | € 200,00 | LuGi | 9 | | Dot Blot | | | |
| F7C | FATTORE VII COAGULAZIONE | N | € 3,55 | LuGi | 12 | 93 | Coagulometrico | % | 90.64.3 | 67 - 143 |
| F8C | FATTORE VIII COAGULAZIONE | N | € 3,55 | LuMe | 14 | 170 | Cronometrico | % | 90.64.3 | 50 - 150 |
| F8MU | FATTORE VIII Mutazioni Emof. A | N | € 650,00 | LuGi | 14 | | PCR | | | Assente |
| FXC | FATTORE X COAGULAZIONE | N | € 3,55 | LuGi | 12 | | Coagulometrico | % | 90.64.3 | 70 - 120 |
| FXI | FATTORE XI COAGULAZIONE | N | € 3,55 | LuMaMeGiVe | 19 | | Coagulometrico | % | 90.64.3 | 70 - 120 |
| FXII | FATTORE XII COAGULAZIONE | N | € 3,55 | LuMaMeGiVe | 20 | | Coagulometrico | % | 90.64.3 | 70 - 150 |
| XIII | FATTORE XIII | N | € 28,00 | LuMaMeGiVe | 15 | 119 | Colorimetrico | % | | 70 - 140 |
| FXIII | FATTORE XIII Mutazione V34L | N | € 100,00 | LuGi | 12 | | PCR | | | Negativo |
| e94 | Fel d 1 Felis domesticus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| FENIL | FENILALANINA | N | € 0,00 | LuMe | 19 | | HPLC | uMol/Mol c | | 2,0 - 19,0 |
| FEN | FENITOINA | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 4 | 111 | CLIA | ug/mL | 90.22.1 | 10,0 - 20,0 |
| FEB | FENOBARBITAL (LUMINALE) | N | € 25,00 | LuMaMeGiVe | 3 | 70 | Turbidimetria | ug/mL | 90.20.3 | 15,0 - 40,0 |
| FENOF | FENOLI URINE (Fine T.) | N | € 26,00 | LuMe | 10 | | HPLC | mg/g creat | | Soggetti non esposti < 20<br>Soggetti esposti < 250<br>(Raccomandazione ACGHI) |
| FENOI | FENOLI URINE (Inizio T.) | N | € 26,00 | LuMe | 8 | | HPLC | mg/L | | Soggetti non esposti < 20<br>Soggetti esposti < 250<br>(Raccomandazione ACGHI) |
| FER | FERRITINA | S | € 4,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | ng/mL | 90.22.3 | Uomo: 20 - 350<br>Donna: 14 - 170<br>Bambini: 10 - 142 |
| SID | FERRO | S | € 1,15 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | Ferrozine | ug/dL | 90.22.5 | Uomo: 50 - 170<br>Donna: 37 - 160<br>Bambini: 37 - 145 |
| SIU | FERRO URINE | N | € 25,00 | LuMe | 7 | | Assorbimento Atomico | ug/24 h | 90.22.4 | < 400 |
| FIBV | FIBRINOGENO FUNZIONALE | S | € 1,75 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 14 | Clauss | mg/dL | 90.65.1 | 180 - 350 |
| FIB | FIBRINOGENO FUNZIONALE | S | € 1,75 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 7 | Clauss | mg/dL | 90.64.6 | 180 - 350 |
| FCI | FIBROSI CISTICA SCR. (152 MUT) | N | € 160,00 | LuMe | 18 | | Next Generation Sequencing | | | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCICO | FIBROSI CISTICA SEQUENZA CFTR | N | € 290,00 | LuGi | 14 | | DHPLC | | | |
| FISLS | FISH LIQUIDO SEMINALE | N | € 190,00 | MaGi | 13 | | FISH | % | | Negativo |
| FLUOE | FLUORO | N | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 1 | | Potenziometrico | mg/L | 90.13.3 | < 0,20 110 |
| FOOD | FOOD TEST 90 Alimenti IgG | N | € 4,30 | LuMaMeGiVeSa | 6 | 95 | EIA 2° generazione | | 90.68.5 | |
| FAC | FOSFATASI ACIDA | N | € 2,00 | LuGi | 6 | 69 | Chimico | U/L | 90.23.4 | Uomo: < 4,7<br>Donna: < 6,5<br>Bambini: < 4,7 |
| PAP | FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | N | € 12,00 | LuGi | 7 | 148 | CLIA | ng/mL | 90.24.2 | Uomo: Fino a 4,6 |
| FAL | FOSFATASI ALCALINA | S | € 1,05 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | Cinetico | U/L | 90.23.5 | Adulti: Adulti 46 - 116<br>12 - 17 anni 120 - 390<br>Bambini: 0 - 1 mese 50 - 250<br>1 - 6 mese 150 - 450<br>1 - 3 anni 70 - 280<br>3 - 6 anni 65 - 270<br>6 - 12 anni 80 - 300<br>12 - 17 anni |
| ISAP | FOSFATASI ALCALINA PLACENTARE | N | € 70,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | EIA | ng/L | | < 100,0 |
| OSTAS | FOSFATASI OSSEA (OSTASE) | S | € 50,00 | LuMaMeGiVe | 2 | 41 | CLIA | ug/L | 90.24.1 | Uomo: 6,0 - 30,0<br>Donna: Pre-menopausa 3,0 - 19,0<br>Post-menopausa 6,0 - 26,0<br>Bambini: 6,0 - 30,0 |
| P | FOSFATO | S | € 1,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Colorimetrico | mg/dL | 90.24.3 | Adulti: 2,5 - 4,8<br>Bambini: 4,0 - 7,0 |
| PUV | FOSFATO URINE | N | € 1,00 | LuMaMeGiVe | 2 | 79 | Spettrofotometria UV | mg/24h | 90.24.3 | |
| PU | FOSFATO URINE | S | € 1,00 | LuMaMeGiVe | 2 | 38 | Spettrofotometria UV | mg/24h | 90.24.3 | |
| 8743 | FOSFOETANOLAMMINA URINARIA | N | € 95,00 | LuMaMeGiVe | 15 | | Enzimatico Colorimetrico | | | |
| PUSP | FOSFORO URINE SPOT | N | € 1,00 | LuMaMeGiVe | 2 | 72 | Spettrofotometria UV | mg/dL | 90.24.3 | 25 - 140 |
| FRU | FRUTTOSAMINA | N | € 25,00 | LuMe | 8 | 50 | Chimico | mMol/L | 90.25.1 | Fino a 285 |
| FRULS | FRUTTOSIO SPERMATICO | N | € 20,00 | LuMe | 21 | | Enzimatico | g/L | | Uomo: 150 - 500 |
| FSH | FSH | S | € 6,20 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | mU/mL | 90.23.3 | Uomo: Adulti 1,6 - 16,8<br>Prebuberale < 3,0<br>Donna: Fase follicolare 3,6 - 13,7<br>Picco ovulatorio 8,2 - 23,4<br>Fase luteale 2,3 - 10,7<br>Postmenopausa 18,0 - 138,0<br>Bambini: 0,1 - 3,0 |
| FT3 | FT3 | S | € 4,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | pg/mL | 90.43.3 | Adulti: > 20 anni 2,30 - 4,35<br>13 - 20 anni 3,00 - 5,60<br>Bambini: 2,30 - 5,40 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT4 | FT4 | S | € 4,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | ng/dL | 90.42.3 | 0,750 - 1,750 |
| G6P | G6PDH | N | € 5,40 | LuMaMeGiVe | 4 | 65 | Cinetico UV G6PD/6PGD | % | 90.27.2 | Normale (nessun fenotipo emolitico) > 85<br>Fenotipi non emolitici:<br>Mutazione di classe V > 150<br>Mutazione di classe IV o normale 65 - 150<br>Fenotipi occasionalmente emolitici:<br>Mutazione di classe III 10 - 65<br>Fe |
| F426 | Gad c 1 Gadus morhua (m1) | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 139 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f233 | Gal d 1 Gallus spp | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 197 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f232 | Gal d 2 Gallus spp | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 197 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| k208 | Gal d 4 Gallus spp | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| GT | GAMMA GT | S | € 1,15 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Cinetico | U/L | 90.25.5 | Uomo: Fino a 50,0<br>Donna: Fino a 32,0<br>Bambini: Fino a 32,0 |
| GLB1 | GANGLIOSIDOSI (GLB1) | N | € 900,00 | LuMaMeGiVe | 28 | | PCR | | | |
| GARDE | GARDNERELLA VAGINALIS DNA | N | € 48,00 | MaGi | 7 | | PCR Ibridazione inversa | | | Negativo |
| GAS | GASTRINA | N | € 14,10 | LuMaMeGiVe | 4 | 89 | CLIA | pg/mL | 90.26.1 | 13 - 115 |
| 6550 | GASTROPROFILE | N | € 160,00 | LuMaMeGi | 18 | 148 | EIA | | | |
| GAA | GENE GAA Mutazioni GSD2 | N | € 450,00 | LuGi | 15 | | Next Generation Sequencing | | | Negativo |
| GENES | GeneSafe Complete | N | € 550,00 | MaGiSa | 15 | | Next Generation Sequencing | | | |
| GENEA | GENESCREEN Easy | N | € 490,00 | LuMaMeGiVe | 30 | | Next Generation Sequencing | | | |
| GENEX | GENESCREEN Expanded | N | € 890,00 | LuMaMeGiVe | 30 | | Next Generation Sequencing | | | |
| GENFO | GENESCREEN Focus | N | € 270,00 | LuMaMeGiVe | 30 | | Next Generation Sequencing | | | |
| GENST | GENESCREEN Standard | N | € 790,00 | LuMaMeGiVe | 30 | | Next Generation Sequencing | | | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | GH | S | € 9,30 | Me | 2 | 18 | CLIA | ng/mL | 90.35.1 | Uomo: Fino a 1,23<br>Donna: Fino a 6,88<br>Bambino: Fino a 3,83<br>Bambina: Fino a 9,13 |
| GIARD | GIARDIA Ag FECALE | N | € 22,00 | LuMe | 3 | 22 | Immunocromatografico | | 90.91.2 | Negativo |
| GJB2 | GJB2 analisi NGS del gene | N | € 250,00 | LuMaMeGiVe | 40 | | Next Generation Sequencing | | | Negativo |
| GLDH | GLDH | N | € 37,00 | | 15 | | | | | < 7,0 |
| GLG | GLUCAGONE | N | € 9,70 | LuMaMeGiVe | 25 | | RIA | ng/L | 90.26.3 | < 209 |
| GLGP | GLUCAGONE DOPO COLAZIONE | N | € 9,70 | LuMaMeGiVe | 25 | | RIA | pg/mL | 90.26.3 | 25 - 250 |
| GL | GLUCOSIO | S | € 1,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Enzimatico | mg/dL | 90.27.1 | Adulti: 70 - 104<br>Bambini: Normale tolleranza al glucosio 70 - 104<br>Alterata tolleranza al glucosio 105 - 125<br>Limite decisionale diagnostico > 125 |
| GLU | GLUCOSIO URINE SPOT | N | € 1,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 62 | Enzimatico | mg/dL | 90.27.1 | < 5 |
| GLU24 | GLUCOSIO URINE 24 h | N | € 1,00 | LuMaMeGiVe | 1 | | Enzimatico | mg/24h | 90.27.1 | < 50 |
| GLURI | GLUTATIONE RIDOTTO | N | € 70,00 | LuMaMeGi | 16 | | HPLC | uMol/L | | 670 - 970 |
| GLUMU | GLUTATIONE S-TRANSFERASI 3 M. | N | € 410,00 | MaGi | 17 | | PCR | | | |
| GLUTO | GLUTATIONE TOTALE | N | € 70,00 | LuMaMeGi | 16 | | HPLC | uMol/L | | 760 - 1200 |
| f431 | Gly m 5 Glycine max | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f432 | Gly m 6 Glycine max | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| GRH | GRUPPO SANGUIGNO E FATT. RH | N | € 9,45 | LuMaMeGiVe | 2 | 58 | Agglutinazione | | 90.65.3 | |
| GSTP1 | GSTP1 (2 Mutazioni) | N | € 120,00 | LuGi | 11 | | SANGE | | | |
| HBAGE | Hb CATENE ALFA MUTAZIONI | N | € 250,00 | LuGi | 15 | | PCR | | | Negativo |
| HBBGE | Hb CATENE BETA MUTAZIONI | N | € 250,00 | LuGi | 15 | | PCR | | | Negativo |
| HBVAE | Hb VARIANTI SCREENING | N | € 33,00 | MaVe | 3 | 80 | Elettroforesi Capillare | | 90.66.7 | Negativo<br>La tecnica separativa utilizzata consente il dosaggio quantitativo dell'HbA2 e dell'HbF qualora presente. Consente inoltre il rilevamento delle emoglobine varianti più frequenti quali HbE, HbD, HbS e Hbc e di altre emoglobine varianti più rare |
| AEG | HBe Ag | S | € 5,35 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 14 | CLIA | | 91.18.4 | Negativo Fino a 1,00<br>Borderline 1,00 - 1,20<br>Positivo > 1,20 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAS | HBs Ag (Antigene Austr.) | S | € 4,10 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | CLIA | IU/mL | 91.18.5 | Negativo < 0,20<br>Borderline 0,20 - 0,30<br>Positivo > 0,30<br><br>Un esito negativo indica la non rilevabilità di HBsAG nell'ambito della sensibilità della metodica. Test CLIA di 2° |
| AASQ | HBs Ag QUANTITATIVO | N | € 25,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 16 | CLIA | IU/mL | 91.18.5 | Negativo < 0,200<br>Borderline 0,200 - 0,300<br>Positivo > 0,300<br><br>Un esito negativo indica la non rilevabilità di HBsAG nell'ambito della sensibilità della metodica. Test CLIA di 2° |
| HBVGE | HBV DNA (Genotipo) | N | € 190,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | PCR | | | |
| HBR | HBV DNA (Qualitativo) | S | € 41,85 | LuMaMeGiVe | 14 | | PCR | | 91.17.3 | Ricerca diretta del DNA virale corrrelato all'epatite di tipo B, previa estrazione, mediante amplificazione RT PCR della regione pre-core/core del genoma virale.<br><br>Sensibilità della tecnica pari a 50 copie/ml. |
| HBQ | HBV DNA (Quantitativo) | N | € 50,00 | LuMaMeGiVe | 14 | 159 | Realtime PCR | pg/mL | 91.17.3 | |
| HCVGE | HCV RNA (Genotipo) | S | € 80,70 | MaGi | 14 | | PCR | | 91.20.2 | Ricerca diretta dell'RNA virale mediante retrotrascrizione, e succcessiva amplificazione Nested-Multiplex della regione CORE con primers tipo-specifici. Classificazione secondo Chan e Simmonds 1992/1993 a,b. |
| HCR | HCV RNA (Qualitativo) | S | € 41,65 | LuMaMeGiVe | 14 | | PCR | | 91.19.3 | Ricerca diretta dell'RNA virale corrrelato all'epatite di tipo C, previa estrazione, mediante amplificazione RT PCR della regione 5' UTR del genoma virale.<br><br>Sensibilità della tecnica pari a 50 copie/ml. |
| HCQ | HCV RNA (Quantitativo) | S | € 49,75 | LuMaMeGiVe | 14 | 166 | PCR | IU/mL | 91.19.4 | Non dosabile |
| HE4 | HE4 | N | € 95,00 | LuGi | 7 | 117 | EIA | pMol/L | 90.56.A | Donna: In età fertile Fino a 70<br>In menopausa Fino a 140 |
| BRHP | HELICOBACTER PYL. BREATH TEST | N | € 48,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 18 | Breath Test | | 44.19.2 | |
| HPF | HELICOBACTER PYLORI Ag FECALE | N | € 26,20 | LuMaMeGiVe | 2 | 16 | Immunocromatografico | | 90.94.C | Negativo |
| HERP6 | HERPES VIRUS 6 DNA | N | € 120,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Negativo |
| HERPC | HERPES VIRUS DNA 1/2 SCREENING | N | € 120,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Negativo |
| HERTA | HERPES VIRUS DNA 1/2 TAMPONE | N | € 120,00 | LuMaMeGiVeSa | 9 | | PCR | | | Negativo |
| HERTI | HERPES VIRUS DNA 1/2 TIPIZZAZ. | N | € 100,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | |
| k220 | Hev b Hevea brasiliensis | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| k218 | Hev b 5 Hevea brasiliensis | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| k221 | Hev b 8 Hevea brasiliensis | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| HIVDN | HIV RNA Qualitativo | S | € 55,50 | LuGi | 7 | | PCR | | 91.22.2 | Negativo |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVQ | HIV RNA Quantitativo | N | € 180,00 | LuGi | 10 | | PCR | | | Non dosabile<br>La sensibilitá è pari a 34,2 UI/ml.<br>Amplificazione con metodica Real Time PCR su piattaforma NeuMoDx 96 Molecular Systems (CE IVD) del genoma di HIV-1. |
| HLA51 | HLA B51 | N | € 120,00 | MaGi | 15 | | PCR | | | Negativo |
| HLAG | HLA G GENOTIPIZZAZIONE | N | € 180,00 | LuMaMeGiVe | 11 | | Realtime PCR | | | Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano |
| B51 | HLA TIPIZZAZIONE B51 | N | € 98,80 | LuGi | 21 | | PCR | | 90.78.4 | Negativo |
| HLA1 | HLA TIPIZZAZIONE CLASSE 1 ABC | N | € 98,80 | LuGi | 21 | | PCR | | 90.78.2 | Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano |
| HLA2 | HLA TIPIZZAZIONE CLASSE 2 | N | € 98,80 | LuMaMeGiVe | 21 | | PCR | | 90.78.2 | Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano |
| HLADQ | HLA TIPIZZAZIONE DQ2 DQ8 DR | N | € 120,00 | LuMaMeGiVe | 15 | 174 | PCR | | 90.80.1 | Analisi mediante PCR e reverse dot blot per i gruppi allelici:<br>DQA1*03, DQA1*05, DQB1*02 E DQB1*0302<br>che costituiscono l'eterodimero DQ2 e DQ8 responsabili di predisposizione a malattia celiaca. Il rischio genetico di sviluppare malattia celiaca dip |
| HLAA | HLA TIPIZZAZIONE LOCUS A | S | € 98,80 | LuGi | 21 | | PCR | | 90.78.2 | Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano |
| HLAB | HLA TIPIZZAZIONE LOCUS B | N | € 98,80 | LuGi | 21 | | PCR | | 90.78.4 | Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano |
| HLAC | HLA TIPIZZAZIONE LOCUS C | N | € 98,80 | LuGi | 21 | | PCR | | 90.79.1 | Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano |
| HLA27 | HLA-B27 | S | € 98,80 | LuMe | 11 | | PCR | | 90.78.4 | Negativo<br>Analisi mediante amplificazione genica (PCR) specifica per l'allele HLA-B27. |
| HPA | HPA-1 Mutazione T1565C | N | € 100,00 | LuGi | 12 | | PCR | | | Analisi molecolare del gene della glicoproteina IIB/IIIA per la ricerca della mutazione T1565C (HPA-1). Un esito negativo indica soggetto omozigote normale. Analisi eseguita mediante estrazione del DNA, amplificazione specifica mediante PCR del gene ed i |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPVGE | HPV DNA (Genotipo) | N | € 85,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Adulti: Ceppi ad alto rischio, riscontrati in carcinomi della mucosa, adenocarcinomi ed altre displasie gravi invasisve, HSIL.<br>HPV 16<br>HPV 18<br>HPV 31,33<br>HPV 35<br>HPV 39 |
| HPV | HPV DNA (Screening qualitat.) | N | € 60,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Negativo<br>L'esame è eseguito su DNA estratto mediante riconoscimento di un frammento appartenente al gene L1 del genoma virale (Manos et al. 1989, Brown et al 1999).<br>Dati epidemiologici:<br>Regione Campioni Positivi<br>USA 623 |
| TOLEP | IDROSSICARBAZEPINA (TOLEP) | N | € 25,00 | LuMaMeGi | 8 | | HPLC | mg/L | | Range terapeutico 13 - 30<br>Dosaggio del metabolita attivo della oxcarbazepina. |
| PIREF | IDROSSIPIRENE Fine turno | N | € 36,00 | LuMe | 14 | 173 | HPLC | mg/g creat | | < 2,70 |
| PIREN | IDROSSIPIRENE Inizio turno | N | € 36,00 | LuMe | 14 | | HPLC | mg/g creat | | < 2,70 |
| IDP | IDROSSIPROLINA URINE | N | € 35,00 | LuGi | 9 | | HPLC | mg24h/mq | 90.28.2 | 5,00 - 22,0 |
| IGA1 | IgA 1 | N | € 70,00 | | 0 | | Nefelometrico | g/L | | 0,76 - 3,28 |
| IGA2 | IgA 2 | N | € 70,00 | | 0 | | Nefelometrico | g/L | | 0,07 - 1,14 |
| IGA | IgA Totali | S | € 3,35 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 9 | Nefelometrico | mg/dL | 90.69.4 | Uomo: 12 - 13 anni 108 - 325<br>Adulti 83 - 406<br>Donna: 12 - 13 anni 108 - 325<br>Adulti 70 - 374<br>Bambini: 36 - 260 |
| IGD | IgD Totali | N | € 25,00 | LuMe | 3 | 176 | RID | U/mL | | < 100 |
| IGE | IgE Totali | S | € 6,60 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | CLIA | U/mL | 90.68.3 | Adulti: Adulti Fino a 100<br>10 - 15 anni Fino a 200<br>Bambini: Neonati Fino a 15<br>1 - 5 anni Fino a 60<br>6 - 9 anni Fino a 90<br>10 - 15 anni Fino a 200<br>Adulti Fino a 100 |
| 6420 | IgF-BP3 | N | € 120,00 | LuMaMeGi | 6 | | CLIA | ug/mL | | Fino a 5 anni 0,7 - 5,2<br>5 - 8 anni 1,1 - 6,5<br>8 - 10 anni 1,6 - 7,7<br>10 - 12 anni 2,1 - 8,9<br>13 - 20 anni 2,9 - 10,0<br>> 20 anni 2,2 - 7,8 |
| IGG1 | IgG 1 | N | € 26,00 | | 0 | 33 | Nefelometrico | g/L | | Uomo: 4,900 - 11,400<br>Donna: 4,050 - 10,110<br>Bambino: 4,900 - 11,900<br>Bambina: 3,150 - 9,450 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGG2 | IgG 2 | N | € 26,00 | | 0 | 33 | Nefelometrico | g/L | | Uomo: 1,500 - 6,400<br>Donna: 1,690 - 7,860<br>Bambino: 1,500 - 6,400<br>Bambina: 0,360 - 2,250 |
| IGG3 | IgG 3 | N | € 26,00 | | 0 | 33 | Nefelometrico | g/L | | Uomo: 0,200 - 1,100<br>Donna: 0,110 - 0,850<br>Bambino: 0,200 - 1,100<br>Bambina: 0,170 - 0,680 |
| IGG4 | IgG 4 | N | € 26,00 | | 0 | 81 | Nefelometrico | g/L | | Uomo: 0,080 - 1,400<br>Donna: 0,030 - 2,010<br>Bambini: 0,080 - 1,400 |
| IGG | IgG Totali | N | € 3,35 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 10 | Nefelometrico | mg/dL | 90.69.4 | Adulti: 12 - 13 anni 610 - 1450<br>Adulti 680 - 1445<br>Bambini: 0 - 6 mesi 170 - 860<br>7 - 24 mesi 330 - 1180<br>3 - 6 anni 460 - 1440<br>7 - 11 anni 530 - 1410<br>12 - 13 anni 610 - 1450<br>Adulti 680 - 1445 |
| IGM | IgM Totali | N | € 3,35 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 10 | Nefelometrico | mg/dL | 90.69.4 | Uomo: 12 - 13 anni 70 - 150<br>Adulti 34 - 214<br>Donna: 12 - 13 anni 70 - 150<br>Adulti 40 - 250<br>Bambini: 36 - 210 |
| IC | IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI | N | € 40,00 | LuMaMeGiVeSa | 9 | 165 | EIA | ug eq/mL | 90.69.1 | Negativo < 4,4<br>Borderline 4,4 - 10,8<br>Positivo > 10,8 |
| IMM | IMMUNOELETTROFORESI | N | € 27,40 | LuMaMeGiVeSa | 3 | 65 | Elettroforesi Capillare | | 90.69.2 | Un esito negativo indica la sostanziale assenza di reazioni monoclonali nel campione esaminato a seguito di immunoprecipitazione con antisieri specifici anti IgA, IgG, IgM, Kappa, Lambda e successiva separazione in elettroforesi capillare. |
| IMU | IMMUNOELETTROFORESI URINE | N | € 4,95 | LuMaMeGiVeSa | 7 | 100 | Elettroforesi Capillare | | 90.69.2 | Un esito negativo indica la sostanziale assenza di reazioni monoclonali nel campione esaminato a seguito di immunofissazione con antisieri specifici anti IgA, IgG, IgM, Kappa, Lambda e successiva separazione in elettroforesi capillare. |
| DIB | INDICE DI DIBUCAINA | N | € 25,00 | LuGi | 3 | 106 | Enzimatico | % | | Omogozigoti normali 70 - 90<br>Eterozigoti 30 - 70<br>Omozigoti atipici < 30 |
| HOMA | Indice di insulinoresistenza | N | € 0,00 | LuMaMeGiVe | 2 | 29 | Calcolato Matematicamente | Index | | < 2,5 |
| H1N1 | Influenza A RNA | N | € 100,00 | LuGi | 3 | | PCR | | | |
| INFLU | Influenza Test (Antigene) | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 1 | | Immunocromatografico | | | |
| INB | INIBINA B | N | € 85,00 | LuGi | 17 | 160 | EIA | pg/mL | | Uomo: 11 - 369<br>Donna: Periodo fertile 10 - 320<br>Menopausa < 18<br>Pluriovulazione Fino a 3000 |
| INS | INSULINA | S | € 5,95 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | uU/mL | 90.29.1 | 1,5 - 17,0 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP3A | Integrina B3 GPIIIa Mut. L33P | S | € 90,00 | LuGi | 14 | | Dot Blot | | 90.64.3 | Un risultato negativo indica assenza della mutazione. La sostituzione della base guanina 1691 con adenina (mutazione G1691A) determina la sostituzione dell'amminoacido arginina con glutamina (R506Q). Esame eseguito mediante estrazione del DNA, amplifica |
| 8441 | INTERFERONE GAMMA | N | € 80,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | Citom. Fl. | pg/mL | | < 10,0 |
| IL1B | INTERLEUCHINA 1 BETA | N | € 150,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | EIA | pg/mL | | < 5,0 |
| IL10M | INTERLEUCHINA 10 POLIMORFISMI | N | € 110,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | PCR | | | Fino a 5,0 |
| IL2 | INTERLEUCHINA 2 | N | € 150,00 | LuMaMeGiVe | 28 | | FCM | pg/mL | | Fino a 5,0 |
| IL2R | INTERLEUCHINA 2 RECETTORI | N | € 150,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | LIA | U/mL | | 158 - 623 |
| IL28M | INTERLEUCHINA 28-B POLIMORF. | N | € 450,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | PCR | | | Fino a 5,0 |
| IL28B | INTERLEUCHINA 28B POLIMORFISMO | N | € 450,00 | LuGi | 10 | | PCR | | | In letteratura è riportato che il genotipo omozigote "CC" è correlato ad una spontanea e più elevata clearance virale e, con l'impiego di una terapia antivirale corretta, mostra una migliore risposta. Al contrario il genotipo omozigote TT o eterozigote CT |
| IL6 | INTERLEUCHINA 6 | N | € 150,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | CLIA | pg/mL | | < 5,9 |
| IL6M | INTERLEUCHINA 6 POLIMORFISMI | N | € 220,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | PCR | | | Fino a 5,0 |
| ILPAN | INTERLEUCHINE PANNELLO | N | € 490,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | PCR | pg/mL | | Fino a 5,0 |
| NIMU | INTOLLERANZA AL NICHEL 2 Mut. | N | € 110,00 | LuMaMeGiVe | 13 | | PCR | | | |
| IODU | IODIO URINE 24 H | N | € 75,00 | LuMaMeGi | 18 | | Cromatografico | ug/L | | Forte carenza < 20<br>Moderata carenza 21 - 50<br>Lieve carenza 51 - 100<br>Apporto normale 101 - 200<br>Apporto aumentato 201 - 300<br>Iperioduria > 300 |
| 79976 | IODIO SIERICO TOTALE | N | € 70,00 | LuMaMeGi | 14 | 197 | EIA | ug/L | | 46,0 - 70,0 |
| LDHIS | ISOENZIMI LDH | N | € 60,00 | LuMaMeGiVe | 15 | 149 | Elettroforetico | % | | |
| ISTA | ISTAMINA | N | € 120,00 | LuMaMeGi | 10 | | EIA | ng/mL | | 0,2 - 1,0 |
| ISTAU | ISTAMINA URINARIA | N | € 90,00 | LuMaMeGi | 13 | | EIA | ng/mL | | |
| IST | ISTOLOGIA | N | € 151,30 | LuMaMeGiVe | 17 | | | | 91.48.3 | |
| IST2 | ISTOLOGIA (2° camp.) | N | € 151,30 | LuMaMeGiVe | 12 | | | | 91.48.3 | |
| ISTRE | ISTOLOGIA REVISIONE | N | € 200,00 | LuMaMeGiVe | 15 | | | | | |
| JAK2S | JAK2 MUT. V617F SCREENING | N | € 150,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | PCR | | | < 0,1<br>DNA genomico estratto da sangue periferico ed analizzato per la stima quantitativa della frazione allelica V617F rispetto all'allele wild-type. L'analisi viene effettuata con tecniche di Real-time PCR tramite kit ipsogen® JAK2 MutaQuant® Qiagen® |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAK2 | JAK2 MUT. V617F QUANTITATIVO | N | € 350,00 | LuMaMeGiVe | 21 | | PCR | % | | < 0,1<br>DNA genomico estratto da sangue periferico ed analizzato per la stima quantitativa della frazione allelica V617F rispetto all'allele wild-type. Analisi effettuata con tecniche di Real-time PCR tramite kit Ipsogen® JAK2 MutaQuant® Qiagen® eseguite |
| f441 | Jug r 1 Juglans regia | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f442 | Jug r 3 Juglans regia | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| KPC | KLEBSIELLA SPP KPC | N | € 28,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 101 | Colturale | | | |
| LACO | LACOSAMIDE | N | € 10,80 | LuMe | 21 | | RIA | pg/mL | 90.04.1 | 1,0 - 10,0 |
| LAMO | LAMOTRIGINA | N | € 27,00 | LuMe | 8 | 68 | HPLC | mg/L | | 3,0 - 14,0 |
| F343M | Lampone (Rubus idaeus) | N | € 7,50 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| LATMU | LATTASI 2 MUTAZIONI | N | € 90,00 | LuMaMeGiVe | 18 | | Next Generation Sequencing | | | |
| LATTA | LATTASI MUTAZIONE T-13910C | N | € 180,00 | LuGi | 11 | | PCR | | | Negativo |
| 1124 | LATTOFERRINA FECALE | N | € 100,00 | LuMaMeGi | 12 | 148 | EIA | | | Fino a 7,2 |
| LDH | LDH | S | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Cinetico UV | U/L | 90.29.2 | Adulti: 120 - 246<br>Bambini: Neonati 120 - 1000<br>Fino a 1 anno 120 - 550<br>Da 1 a 5 anni 120 - 280<br>Adulti 120 - 246<br>I valori di riferimento in età pediatrica sono indicativi. |
| LEGIO | LEGIONELLA PNEUMOPHILA Ag | N | € 30,00 | LuMaMeGi | 4 | | Immunocromatografico | | 90.95.2 | Negativo |
| LEGUR | LEGIONELLA PNEUMOPHILA Ag | N | € 46,00 | LuMaMeGi | 5 | | Immunocromatografico | | | Negativo |
| LEGAB | LEGIONELLA PNEUMOPHILA Ig Tot. | N | € 46,00 | Ve | 8 | | IFA | Titolo | | < 1:256 |
| LESPR | LEISHMANIA (PCR) | N | € 100,00 | LuGi | 7 | | PCR | | | Assente |
| 1163 | LEPTINA | N | € 90,00 | LuMaMeGi | 15 | | EIA | ng/mL | | Uomo: < 6<br>Donna: < 12<br>Bambino: < 6<br>Bambina: < 12 |
| LAP | LEUCINA AMINOPEPTIDASI (LAP) | N | € 50,00 | LuMe | 9 | | Nagel | U/L | | 0,30 - 0,70 |
| 6208 | LEVETIRACETAM (KEPPRA) | N | € 85,00 | LuMaMeGi | 8 | 105 | HPLC | mg/L | | Intervallo terapeutico 20,0 - 40,0<br>Livello di tossicità > 400,0 |
| 1128 | LEVODOPA | N | € 78,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | LC MSMS | | | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH | LH | N | € 13,50 | Me | 2 | 6 | CLIA | mU/mL | 90.32.3 | Uomo: Adulti 1,4 - 11,2<br>Prepuberale < 3,0<br>Donna: Fase follicolare 1,9 - 14,9<br>Picco ovulatorio 16,8 - 82,1<br>Fase luteale 1,5 - 17,9<br>Postmenopausa 15,0 - 43,0<br>Bambini: 0,1 - 3,0 |
| LH2PR | LH (2 Pr.) | N | € 18,00 | Me | 1 | | CLIA | mU/mL | 90.32.3 | Uomo: 1,4 - 11,2<br>Donna: 1,5 - 82,1<br>Bambini: 0,1 - 3,0 |
| LINFT | LINFOCITI REGOLATORI T | S | € 50,00 | LuMaMeGiVe | 4 | | Citom. Fl. | | 90.81.5 | |
| LPS | LIPASI | N | € 2,60 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | Cinetico | U/L | 90.30.2 | 5 - 54 |
| LPA | LIPOPROTEINA A | N | € 4,85 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 33 | Nefelometrico | mg/L | 90.30.3 | Fino a 300 |
| LISO | LISOZIMA | N | € 30,00 | LuMe | 7 | 179 | Enzimatico | mg/L | | 3,0 - 9,0 |
| LI | LITIO | N | € 9,90 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 17 | Colorimetrico | mEq/L | 90.32.2 | Concentrazione terapeutica 0,60 - 1,20<br>Concentrazione tossica > 1,50<br>Limite di rilevabilità 0,05 |
| LIU | LITIO URINE SPOT | N | € 14,00 | LuGi | 5 | | Fotometria a fiamma | mEq/24h | | Assente |
| LIST | LYSTERIA MONOCYTOGENES (DNA) | N | € 150,00 | LuGi | 0 | 146 | PCR | | | |
| AMPEG | MACROAMILASI | N | € 7,10 | Me | 5 | | Precipitazione | U/L | 90.38.2 | Uomo: 2,8 - 18,5<br>Donna: 6,3 - 23,5<br>Bambini: 2,0 - 18,5 |
| PRPEG | MACROPROLATTINA | N | € 7,10 | LuMaMeGiVeSa | 5 | 146 | CLIA | ng/mL | 90.38.2 | Test di recupero per macroprolattina. Il test è significativo solo in caso di iperprolattinemia.<br>Assenza di macroprolattina 60 - 100<br>Possibile presenza di macropr. 50 - 60<br>Probabile presenza di macropr. 0 - 50 |
| MG | MAGNESIO | N | € 1,65 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Colorimetrico | mg/dL | 90.32.5 | 1,70 - 2,70 |
| MGU | MAGNESIO URINE | N | € 1,65 | LuMaMeGiVe | 2 | 50 | Colorimetrico | mg/24h | 90.32.5 | |
| MGUSP | MAGNESIO URINE SPOT | N | € 1,65 | LuMaMeGiVe | 2 | | Colorimetrico | mg/L | 90.32.5 | 50 - 300 |
| MALAG | MALARIA PARASSITA Ag | N | € 39,00 | LuMaMeGi | 5 | | Immunocromatografico | | | Negativo |
| MALMI | MALARIA RICERCA PARASSITA | N | € 30,00 | LuMaMeGi | 5 | | Microscopia digitale | | | Negativo |
| 1586 | MALONILALDEIDE | N | € 32,00 | LuMaMeGi | 1 | | Enzimatico | U/L | | < 36,0 |
| MN | MANGANESE | N | € 35,00 | LuMe | 12 | | Assorbimento Atomico | ug/L | 90.33.1 | Fino a 10,0 |
| MANGU | MANGANESE URINE SPOT | N | € 34,00 | LuMe | 12 | | Assorbimento Atomico | | | |
| F49M | Mela | S | € 20,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEL | MELANURIA | N | € 21,00 | LuMe | 9 | | Chimico | | | Assente |
| 545 | MELATONINA | N | € 60,00 | LuMaMeGi | 18 | | EIA | pg/mL | | 3,0 - 16,0 |
| MEREM | MERCURIO | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 21 | | Assorbimento Atomico | ug/L | | < 15,00 |
| MER | MERCURIO URINE SPOT | N | € 40,00 | LuMe | 14 | | Assorbimento Atomico | ug/g creat | | Fino a 35,0 |
| DROM | METABOLITI REATTIVI OSSIGENO | N | € 35,00 | LuMaMeGi | 4 | 54 | Spettrofotometria | U/Carr | | Normale 250 - 300<br>Borderline 300 - 320<br>Stress Ossidativo:<br>Lieve 320 - 340<br>Moderato 340 - 400<br>Elevato 400 - 500<br>Elevatissimo > 500 |
| METAE | METAEMOGLOBINA | N | € 23,00 | LuMaMeGiVe | 7 | | Carbossim. | % | | Fino a 1,00 |
| MEPA | METANEFRINE | N | € 125,00 | LuGi | 21 | | HPLC | pg/mL | | |
| META | METANEFRINE URINE | N | € 45,00 | LuGi | 13 | 205 | HPLC | ug/24h | 90.04.3 | |
| MDELY | MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y | N | € 100,00 | MaGi | 12 | | Fl. PCR | | | Uomo: Analisi condotta mediante amplificazione della cromosoma Y (AZF) nelle regioni:<br>ZFX/ZFY(SY18) Ext., SRY (SY14) Ext, ZFX/ZFY(SY18) Int., SRY (SY14), SY254, SY84, SY86, SY143, SY134, SY157, SY83, SY127, SY82, SY135, SY87, SY160, SY128, SY158, SY81, SY121<br>Bambino: Analisi condotta mediante amplificazione della cromosoma Y (AZF) nelle regioni:<br>ZFX/ZFY(SY18) Ext., SRY (SY14) Ext, ZFX/ZFY(SY18) Int., SRY (SY14), SY254, SY84, SY86, SY143, SY134, SY157, SY83, SY127, SY82, SY135, SY87, SY160, SY128, SY158, SY81, SY121 |
| MMP | MIELOPROLIFERAZIONE NGS | N | € 990,00 | LuMaMeGiVe | 40 | | Next Generation Sequencing | | | |
| MIO | MIOGLOBINA | N | € 4,30 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 29 | CLIA | ug/L | 90.33.5 | Fino a 46,0<br>Probabile danno cardiaco > 110,0 |
| MIOUR | MIOGLOBINA URINE | N | € 4,30 | LuMe | 10 | | Nefelometrico | ug/L | 90.33.5 | Adulti: < 6,0 |
| MNE | MORFOLOGIA NEMASPERMICA | N | € 30,00 | Me | 1 | 61 | Microscopia digitale | | 90.31.4 | |
| MPL | MPL W515LK QUALITATIVA | N | € 290,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | PCR | | | Negativo<br>Amplificazione dell'esone 10 del gene MPL tramite oligonucleotidi custom e successiva reazione di sequenziamento Sanger bidirezionale mediante BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit. Analisi dei prodotti di PCR mediante elettroforesi capi |
| MTH | MTHFR (2 Mutazioni) | N | € 120,00 | LuGi | 11 | 207 | PCR Ibridazione inversa | | | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O214 | MUXF3 Bromeline | N | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 219 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| BKE | MYCOB. TUBERCOLOSIS DNA (Esp.) | N | € 120,00 | LuGi | 30 | | PCR | | | Negativo |
| BKU | MYCOBACT. TUBERC. DNA (Urine) | N | € 120,00 | LuGi | 7 | 101 | PCR | | | Ricerca diretta di micobatteri previa estrazione del DNA ed amplificazione multiplex PCR mediante riconoscimento della regione di inserzione IS986 (regione comune al Micobacterium Complex BCG) e della regione codificante per la proteina mtp40, altamente |
| BK | MYCOBACT. TUBERCOLOSIS DNA | N | € 120,00 | LuGi | 21 | 200 | PCR | | | Negativo |
| MGDNA | MYCOPLASMA GENITALIUM DNA | N | € 48,00 | LuGi | 11 | | PCR | | | Negativo |
| MHDNA | MYCOPLASMA HOMINIS DNA | N | € 48,00 | LuGi | 11 | | PCR | | | Negativo |
| NEISS | NEISSERIA GONORRHOEAE DNA | N | € 48,00 | MaGi | 7 | 14 | PCR | | | < 50<br>Esame eseguito mediante amplificazione specificifa e rivelazione Real Time della regione pJD1p10 del genoma di Neisseria gonorrhoeae su AB 7300.<br>Limite inferiore di sensibilità 50 copie/ml. |
| A835 | NEOPLASIA ENDOCRINA MULT. MEN1 | N | € 550,00 | MaGiSa | 40 | | Next Generation Sequencing | | | |
| NI | NICHEL | N | € 35,00 | LuMaMeGiVe | 8 | | Assorbimento Atomico | ug/L | | Fino a 2,0 |
| NIU | NICHEL URINE | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 10 | | Assorbimento Atomico | ug/L | | < 5,0 |
| NOATB | No antibiogramma | N | € 0,00 | LuMaMeGiVeSa | -1 | | | | | |
| NSE | NSE (ENOLASI NEURONE SPECIF.) | S | € 16,60 | LuMaMeGiVe | 2 | 63 | CLIA | ng/mL | 90.18.4 | Fino a 18,3 |
| NTBNP | NT-Pro-BNP | N | € 11,90 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 6 | CLIA | pg/mL | 90.36.6 | Uomo: Fino a 55 anni < 143<br>55 - 64 anni < 650<br>65 - 74 anni < 512<br>> 75 anni < 603<br>Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As<br>Donna: Fino a 55 anni < 208<br>55 - 64 anni < 912<br>65 - 74 anni < 533<br>> 75 anni < 655<br>Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As<br>Bambini: Fino a 125 |
| t224 | Ole e 1 Olea europaea | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| t227 | Ole e 7 Olea europaea | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| t240 | Ole e 9 Olea europaea | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| F342 | Oliva (Frutto, olea europeae) | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 4 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEOM | Omnia (63 Patol. Agg.) | N | € 750,00 | MaGiSa | 15 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VEFA | Omnia Family (4 Pat. Eredit.) | N | € 300,00 | MaGiSa | 15 | | Next Generation Sequencing | | | |
| OMO | OMOCISTEINA | N | € 11,30 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | CLIA | uMol/L | 90.34.6 | Normale < 15<br>Probabile deficit vitaminico 15 - 30<br>Iperomocisteinemico > 30<br><br>Per valori > 30 si consiglia la ricerca della mutazione MTHFR. |
| OMOU | OMOCISTEINA URINE SPOT | N | € 50,00 | LuGi | 7 | | HPLC | uMol/L | | Normale 5,0 - 12,0<br>Lievemente elevata 12,0 - 30,0<br>Moderatamente elevata 30,0 - 100,0<br>Fortemente elevata > 100,0<br><br>Omocisteinuire > 100,0 micromol/l sono generalmente associate a forme genetiche. |
| ONCCO | Oncoscreening COMPLETE | N | € 990,00 | MaGiSa | 15 | | Next Generation Sequencing | | | |
| AMH | ORMONE ANTIMULLERIANO (AMH) | N | € 70,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 19 | CLIA | ng/mL | 90.17.G | Uomo: 1,43 - 11,60<br>Donna: Età Mediana Range<br>20 - 24 anni 4,000 1,520 - 9,950<br>25 - 29 anni 3,310 1,200 - 9,050<br>30 - 34 anni 2,810 0,711 - 7,590<br>35 - 39 anni 2,000 0,405 - 6,960<br>40 - 44 anni 0,882 |
| OSMP | OSMOLARITA' PLASMATICA | N | € 15,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | Calcolato Matematicamente | mOsm/L | | 280 - 301 |
| OSMU | OSMOLARITA' URINARIA | N | € 15,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 45 | Calcolato Matematicamente | mOsm/L | | 280 - 301 |
| ACOSS | OSSALATO URINE | N | € 8,35 | LuMaMeGiVe | 8 | 79 | Enzimatico | mg/24h | 90.35.3 | |
| OST | OSTEOCALCINA | S | € 17,20 | LuMaMeGiVe | 1 | 54 | CLIA | ng/mL | 90.35.4 | Uomo: Adulti 4,6 - 65,4<br><br>Livelli aumentati di osteocalcina si osservano nell' aumento del turnover osseo. L'osteocalcina è risultata elevata in caso di morbo di Paget, metastasi ossee, iperparatiroidismo primario e osteodistrofia re<br>Donna: Pre-menopausa 6,5 - 42,3<br>Post-menopausa 5,4 - 59,1<br><br>Livelli aumentati di osteocalcina si osservano nell' aumento del turnover osseo. L'osteocalcina è risultata elevata in caso di morbo di Paget, metastasi ossee, i |
| P1NP | P1NP Propt. Procollagene 1 | N | € 75,00 | LuMe | 5 | 122 | CLIA | pg/mL | 90.41.6 | Uomo: 19-90<br>Donna: 15-59<br>Postmenopausa 16-73 |
| PAIMU | PAI-I MUTAZIONE MUTAZIONE 4G | N | € 115,00 | LuGi | 14 | | PCR | | | Il polimorfismo PAI-1 4G/4G (presente omozigote) è stato associato ad aumentati livelli plasmatici di PAI-1 ed ad un aumento del rischio cardivascolare generale e di preeclampsia nelle gravide.<br>Dawson (1993) J Biol Chem 268, 10739. |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI14 | PANNELLO 14 PATOGENI STI PCR | N | € 120,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | PCR | | | |
| STI28 | PANNELLO 28 PATOGENI STI PCR | N | € 150,00 | LuMaMeGiVe | 14 | | PCR | | | |
| A1703 | PANNELLO ANTIBL. IRINOTECANO | N | € 430,00 | LuMaMeGiVe | 18 | | Next Generation Sequencing | | | |
| 6324 | PANNELLO CONNETTIVITI | N | € 120,00 | LuMaMeGiVeSa | 21 | | BLOT | | | |
| 6332 | PANNELLO EPATOPATIE AUTOIMMUNI | N | € 90,00 | LuMaMeGiVeSa | 21 | 168 | BLOT | | | |
| 1939 | PANNELLO MIOSITI | N | € 150,00 | LuMaMeGiVeSa | 21 | 198 | BLOT | | | |
| 6331 | PANNELLO MIOSITI DERMATOMIOS. | N | € 120,00 | LuMaMeGiVe | 16 | | Immunoblot | | | |
| GEDNA | PANNELLO PATOGENI GENITALI | S | € 96,15 | LuMaMeGiVe | 9 | | PCR | | | |
| PRECD | PANNELLO PRECONCEZIONALE DONNA | N | € 430,00 | MaGi | 21 | | PCR | | | |
| PRECU | PANNELLO PRECONCEZIONALE UOMO | N | € 310,00 | MaGi | 14 | | PCR Ibridazione inversa | | | |
| TRO15 | PANNELLO TROMBOFILIA | N | € 300,00 | LuMeVe | 14 | | PCR | | | |
| VASK | PANNELLO VASCULITI | N | € 12,60 | LuMe | 7 | | ELIA | | 90.48.2 | |
| PAT | PAP TEST | N | € 17,00 | LuMaMeGiVe | 12 | | | | 91.38.5 | |
| THIN | PAP TEST FASE LIQUIDA (LBC) | N | € 17,00 | LuMaMeGiVe | 8 | | | | 91.38.5 | |
| 10269 | PAP-TEST | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| 10270 | PAP-TEST (THIN PREP) | N | € 21,15 | LuMaMeGiVe | 12 | | Microscopia digitale | | 91.39.4 | |
| W211 | Par j 2 Parietaria judaica | S | € 38,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 70 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| PTH | PARATORMONE 1-84 (Intatto) | S | € 8,80 | LuMaMeVe | 2 | 6 | CLIA 3° generazione | pg/mL | 90.35.5 | 6,0 - 39,0 |
| 538 | PARVOVIRUS B19 DNA | N | € 180,00 | LuMaMeGi | 10 | | PCR | | 91.11.5 | Negativo |
| F35M | Patate | S | € 20,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| PCA3 | PCA3 | N | € 480,00 | LuMe | 21 | | TMA | | | Uomo: < 35 |
| F351 | Pen a 1 Penaeus aztecus | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 127 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| PERME | PERMEABILITA' INTESTINALE | N | € 0,00 | LuMaMeGi | 15 | | Microtitolazione | | | |
| F95M | Pesca | S | € 20,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g205 | Phl p 1 Phleum pratense | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| g215 | Phl p 5 Phleum pratense | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| g209 | Phl p 6 Phleum pratense | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| g210 | Phl p 7 Phleum pratense | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 100 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| PIOE | PIOMBO | N | € 26,00 | LuMe | 9 | | Assorbimento Atomico | ug/dL | | Uomo: Lavoratori < 60,0<br>Sorveglianza DL 25/2002 > 40,0<br>Donna: Lavoratrici in età fertile < 40,0<br>Lavoratori < 60,0<br>Sorveglianza DL 25/2002 > 40,0<br>Bambini: Lavoratrici in età fertile < 40,0<br>Lavoratori < 60,0<br>Sorveglianza DL 25/2002 > 40,0 |
| PIU | PIOMBO URINE SPOT | N | € 26,00 | LuMe | 11 | | Assorbimento Atomico | ug/g creat | | Soggetti esposti < 50,0<br>Soggetti non esposti < 3,5 |
| PK | PIRUVATO CHINASI ERITROCIT. | N | € 65,00 | LuMaMeGi | 12 | | Cinetico | U/g Hb | | 4,1 - 15,2 |
| PLS | PLASMINOGENO | N | € 5,30 | LuMe | 9 | | Cromatografico | % | 90.71.5 | 75 - 140 |
| EMCIT | PLT confermate in citrato | N | € 3,15 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 29 | Flow Cit. Perox | | 90.62.2 | |
| EMEPA | PLT confermate in eparina | N | € 3,15 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 74 | DHSS - MDSS | | 90.62.2 | |
| i210 | Pol d 5 Polistes dominulus | N | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 171 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| VIP | POLIPEPTIDE INT. VASOATTIVO | N | € 97,00 | LuMaMeGi | 21 | | RIA | pMol/L | | < 100,0 |
| PP | POLIPEPTIDE PANCREATICO | N | € 115,00 | LuMaMeGi | 23 | | RIA | pMol/L | | < 100 |
| F83M | Pollo | S | € 20,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| COPOR | PORFIRINE FECALI URINE SPOT | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 10 | 86 | Spettrofotometria | ug/24h | | < 150,0 |
| POR | PORFIRINE TOTALI URINE | N | € 30,00 | LuMaMeGiVe | 10 | | Spettrofotometria | ug/24h | | Fino a 220,0 |
| PFB | PORFOBILINOGENO | N | € 25,00 | LuMe | 8 | | Cromatografico | mg/24h | | 0 - 2 |
| K | POTASSIO | S | € 1,25 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | ISE | mMol/L | 90.37.4 | 3,50 - 5,60 |
| KUSP | POTASSIO URINE SPOT | N | € 1,25 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 63 | ISE | mEq/L | 90.37.4 | 15,0 - 60,0 |
| KU | POTASSIO URINE | N | € 1,25 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 30 | ISE | mEq/24h | 90.37.4 | |
| PBA | POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSS. | N | € 28,00 | LuMaMeGiVe | 4 | | Colorimetrico | uMol/L | | Valori desiderabili > 2200<br>Borderline 2000 - 2200<br>Discreta carenza 1800 - 2000<br>Carenza 1600 - 1800<br>Forte carenza 1400 - 1600<br>Fortissima carenza |
| PARTE | POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO | N | € 12,00 | LuMaMeGiVe | 8 | | Colturale | | | Negativo |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | PREALBUMINA | N | € 30,00 | LuMaMeGi | 7 | 99 | Turbidimetria | mg/dL | | 10,0 - 40,0 |
| PREE | PREECLAMPSIA TEST | N | € 160,00 | LuMaMeGiVe | 21 | | ECL | | | |
| PREGT | PREGNANTRIOLO | N | € 45,00 | LuMaMeGiVe | 9 | | GC MS | mg/24h | | Adulti: < 2,00<br>Bambini: < 0,40 |
| PREGN | PREGNENOLONE | N | € 100,00 | LuMaMeGi | 18 | | RIA | ng/dL | | Adulti: Adulti Fino a 350,0<br>2 - 15 anni Fino a 235,0<br>Bambini: Fino a 235,0 |
| PRE3 | PrenatalSafe 3 | N | € 450,00 | LuMaMeGiVe | 4 | | Next Generation Sequencing | | | |
| PRE5 | PrenatalSafe 5 | N | € 600,00 | LuMaMeGiVe | 4 | | Next Generation Sequencing | | | |
| PRECO | PrenatalSafe Complete | N | € 1300,00 | LuMaMeGiVeSa | 15 | | Next Generation Sequencing | | | |
| PRECP | PrenatalSafe Complete Plus | N | € 1400,00 | LuMaMeGiVe | 15 | | Next Generation Sequencing | | | |
| PREK | PrenatalSafe Karyo | N | € 850,00 | LuMaMeGiVe | 6 | | Next Generation Sequencing | | | |
| PREKP | PrenatalSafe Karyo Plus | N | € 950,00 | LuMaMeGiVe | 6 | | Next Generation Sequencing | | | |
| PREP | PrenatalSafe Plus | N | € 750,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | Next Generation Sequencing | | | |
| PRIMI | PRIMIDONE | N | € 38,00 | LuMe | 5 | | FPIA | ug/mL | | Intervallo terapeutico 5,0 - 12,0 |
| 1172 | pro PSA | N | € 195,00 | LuMaMeGi | 10 | 126 | CLIA | % | | Uomo: 0 - 21 |
| PCT | PROCALCITONINA | N | € 90,00 | LuMaMeGiVe | 2 | 3 | CLIA | ug/L | | 0 - 0,10 |
| 6412 | PROCOLLAGENE III PROPEPTIDE | N | € 110,00 | LuMaMeGi | 1 | | RIA | U/mL | | Adulti: 0,3 - 0,8 |
| PRG | PROGESTERONE | S | € 7,90 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA 2° generazione | ng/mL | 90.38.1 | Uomo: 0,1 - 1,5<br>Donna: Fase follicolare 0,2 - 1,5<br>Fase luteale 2,5 - 28,5<br>Bambini: 0,1 - 1,5 |
| PG2 | PROGESTERONE (2 Pr.) | N | € 7,90 | LuMaMeGiVeSa | 8 | | CLIA | ng/mL | 90.38.1 | |
| PRL | PROLATTINA | S | € 7,10 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | ng/mL | 90.38.2 | Uomo: 4,0 - 19,5<br>Donna: In età fertile 6,0 - 26,5<br>Postmenopausa 4,0 - 20,0<br>Bambini: 4,0 - 19,5 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAM | PROTEINA AMILOIDE A | N | € 65,00 | LuMaMeGiVe | 13 | | Turbidimetria | mg/L | | Fino a 6,4 |
| PCC | PROTEINA C ANTICOAGULANTE | N | € 5,25 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 11 | Coagulometrico | % | 90.72.2 | 70,0 - 140,0 |
| PCQ | PROTEINA C REATTIVA ALTA SENS. | N | € 3,25 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Turbidimetria | mg/L | 90.72.3 | Fino a 3,00 |
| PCCMU | PROTEINA C RICERCA MUTAZIONI | N | € 3,55 | LuGi | 14 | | PRC | | 90.64.3 | Un risultato negativo indica assenza della mutazione. La sostituzione della base guanina 1691 con adenina (mutazione G1691A) determina la sostituzione dell'amminoacido arginina con glutamina (R506Q). Esame eseguito mediante estrazione del DNA, amplifica |
| ECP | PROTEINA CATIONICA EOSINOFILI | N | € 52,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 92 | CLIA | ug/L | | Fino a 24,0 |
| PSC | PROTEINA S LIBERA FUNZIONALE | N | € 11,15 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 11 | Coagulometrico | % | 90.72.5 | Uomo: 67,5 - 139,0<br>Donna: 60,1 - 113,6<br>In terapia anticoncezionale 52,0 - 105,8<br>Bambini: 67,5 - 139,0 |
| PRO | PROTEINE TOTALI | S | € 0,90 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 6 | Colorimetrico | g/dl | 90.38.5 | 6,0 - 8,5 |
| PRU | PROTEINE URINE | N | € 0,90 | LuMaMeGiVe | 2 | 35 | Colorimetrico | g/24h | 90.38.5 | |
| PRUSP | PROTEINE URINE SPOT | S | € 0,90 | LuMaMeGiVe | 2 | 42 | Colorimetrico | g/L | 90.38.5 | |
| 458 | PROTROMBINA FRAMMENTO 1-2 | N | € 80,00 | LuMaMeGi | 15 | | EIA | pMol/L | | 69,0 - 229,0 |
| PE | PROVE EMOGENICHE | N | € 16,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 1 | | | | |
| F420 | Pru p 3 Prunus persica | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 139 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f421 | Pru p 4 Prunus persica | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| PSA | PSA (Ag PROSTATICO SPECIFICO) | S | € 13,50 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | ng/mL | 90.56.5 | Uomo: Fino a 3,00 |
| PSL | PSA LIBERO | N | € 18,50 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | ng/mL | 90.56.5 | Uomo: Fino a 2,50 |
| PSARE | PSA REFLEX | N | € 18,50 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | CLIA | ng/mL | 90.56.9 | |
| PTT | PTT | N | € 2,50 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Coagulometrico | | 90.76.1 | Soggetti normali 21 - 35<br>Intervallo terapeutico 36 - 70 |
| CU | RAME | N | € 4,90 | LuMaMeGiVe | 2 | 102 | Colorimetrico | ug/dL | 90.39.4 | Uomo: 70 - 140<br>Donna: 80 - 155<br>Bambini: 70 - 155 |
| CUU24 | RAME URINE | N | € 4,90 | LuMaMeGiVe | 12 | | Assorbimento Atomico | ug/L | 90.39.4 | < 24,0 |
| CUU | RAME URINE SPOT | N | € 4,90 | LuMaMeGiVe | 12 | 175 | Assorbimento Atomico | ug/L | 90.39.4 | < 24,0 |
| RAPO | RAPPORTO APO B/APO A-1 | N | € 0,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Calcolato Matematicamente | Ratio | | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR | RAPPORTO LH/FSH | N | € 0,00 | LuMaMeGiVe | 1 | | Calcolato Matematicamente | % | | Uomo: Probabilità di biopsia positiva in pazienti con PSA Totale compreso fra 4,0 ng/ml e 10,0 ng/ml negativi al DRE in funzione della % PSA Libero:<br>> 51 Bassisima probabilità di positività<br>11 - 51 Aumentata probabilità di positività<br>< 11 Alt |
| STFR | RECETTORE SOLUB. TRANSFERRINA | N | € 55,00 | LuMaMeGi | 4 | 85 | Nefelometrico | | | 0,76 - 1,76 |
| RECLI | RENINA DIRETTA (Clinostatismo) | S | € 22,75 | Me | 3 | 11 | CLIA | uIU/mL | 90.40.2 | 2,8 - 39,9 |
| REMO | RENINA DIRETTA (Dopo moto) | S | € 22,75 | Me | 4 | 14 | CLIA | uIU/mL | 90.40.2 | |
| REORT | RENINA DIRETTA (Ortostatismo) | S | € 22,75 | Me | 3 | 19 | CLIA | uIU/mL | 90.40.2 | Fino a 46,1 |
| ROG | RESISTENZA OSMOTICA ERITROCIT. | N | € 14,50 | LuMaMeGiVe | 3 | 10 | Viola | NaCl% | 90.74.4 | |
| RET | RETICOLOCITI | S | € 5,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | Flow Cit. Perox | | 90.74.5 | |
| RBP | RETINOL BINDING PROTEIN RBP | N | € 28,00 | LuMaMeGi | 13 | | Nefelometrico | mg/dL | | 3,00 - 6,00 |
| RHFE | Rh FETALE (D) | N | € 160,00 | LuMaMeGiVe | 21 | | PCR | | | Analisi eseguita mediante amplificazione genica PCR con metodica Real Time a livello degli esoni 5 e 7 del gene RHD (1p36.11).<br>L'assenza del segnale relativo all'amplificazione del gene RHD potrebbe essere dovuta ad assenza di DNA fetale rilevabile nel s |
| ROMA | ROMA INDEX | N | € 0,00 | LuMaMeGiSa | 3 | 126 | Calcolato Matematicamente | | | Donna:<br>Premenopausa:<br>Alto rischio > 13,1 %<br>Basso rischio < 13,1 %<br>Postmenopausa:<br>Alto rischio > 27,7 %<br>Basso rischio < 27,7 % |
| ROTFE | ROTAVIRUS Ag FECALE | N | € 16,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | Immunometrico | | 91.06.5 | Negativo |
| RUBEP | RUBELLA RNA | N | € 90,00 | MaGi | 6 | | PCR | | | Negativo<br>Il limite di rilevabilità della metodica è pari a 50 copie/ml. |
| S100 | S100 | N | € 65,00 | LuMaMeGiVe | 18 | 106 | CLIA | ug/L | | Fino a 0,150 |
| SAL | SALICILATI | N | € 25,00 | LuMe | 8 | | Enzimatico | mg/dL | 90.20.4 | 20 - 25 |
| SOF | SANGUE OCCULTO NELLE FECI | S | € 3,45 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 13 | Immunocromatografico | | 90.21.4 | Negativo |
| COVAS | SARS-COV-2 Ag | N | € 18,80 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 2 | Immunometrico | | 90.95.5 | Negativo<br>Caratteristiche attese su sintomatici:<br>Sensibilità > 96 %<br>Specificità > 97 %<br>In caso di esito negativo e sintomatologia suggestiva può risultare utile integrazione con tampone ultrasensibile di 3° generazione o molecolare. |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVAG | SARS-COV-2 Ag (3° gen.) | N | € 18,80 | LuMaMeGiVeSa | 0 | | Immunofluorescenza microfluid. | | 90.95.5 | Negativo |
| COVGE | Sars-CoV2 RNA RT-PCR | N | € 60,00 | LuMaMeGiVe | 0 | 8 | PCR | | | Negativo<br>Il metodo utilizzato analizza i seguenti geni specifici per SARS CoV-2: Orf8 e RdRP.<br>Sensibilità >97% (100gEq/ml, 2 copie/reaz.)<br>Specificità >97%<br>The method used analyzes the following specific genes for SARS-CoV-2: Orf8 and RdRP<br>Sensit |
| COVSA | Sars-CoV2 RNA RT-PCR SALIVARE | N | € 60,00 | LuMaMeGiVe | 1 | | PCR | | | Negativo<br>Il metodo utilizzato analizza i seguenti geni specifici per SARS CoV-2: Orf8 e RdRP.<br>Sensibilità >97% (100gEq/ml, 2 copie/reaz.)<br>Specificità >97%<br>The method used analyzes the following specific genes for SARS-CoV-2: Orf8 and RdRP<br>Sensit |
| SCH | SCOTCH-TEST | S | € 8,65 | LuMaMeGiVe | 1 | 22 | Microscopia digitale | | 90.93.2 | Negativo |
| DRUG | SCREENING SOSTANZE D'ABUSO | N | € 55,00 | LuMaMeGiVe | 1 | 10 | Immunometrico | | 90.40.8 | |
| DRUG2 | SCREENING SOSTANZE D'ABUSO 12S | N | € 120,00 | LuMe | 4 | 53 | Immunometrico | | 90.18.3 | |
| SELE | SELENIO | N | € 40,00 | LuMaMeGiVeSa | 11 | 149 | Assorbimento Atomico | ug/mL | | 50,0 - 159,0 |
| SEROT | SEROTONINA | N | € 30,00 | LuMaMeGi | 12 | 173 | HPLC | ug/L | | 117,5 - 193,3 |
| SERU | SEROTONINA URINE | N | € 30,00 | LuMe | 14 | | HPLC | ug/24h | | 88 - 176 |
| SHB | SHBG (SEX HORM. BIND. GLOB.) | N | € 20,00 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 28 | CLIA | nMol/L | 90.25.7 | Uomo: 12 anni 32 - 140<br>13 anni 21 - 128<br>14 anni 20 - 101<br>15 anni 14 - 88<br>16 - 20 anni 14 - 69<br>21 - 50 anni<br>Donna: 11 - 15 anni 20 - 121<br>16 - 20 anni 20 - 140<br>Pre-menopausa 10 - 180<br>Post-menopausa 23 - 160<br>Bambino: 2 - 10 anni 52 - 164<br>11 anni 36 - 150<br>12 anni 32 - 140<br>13 anni 21 - 128<br>14 anni 20 - 101<br>15 anni<br>Bambina: 2 - 10 anni 38 - 180<br>11 - 15 anni 20 - 121<br>16 - 20 anni 20 - 140<br>21 - 50 anni 15 - 95 |
| SVW | SIERODIAGNOSI VIDAL-WRIGHT | S | € 10,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 116 | Immunologico | | 91.08.1 | |
| SINQP | SINOVIALE Elettroforesi prot. | N | € 5,10 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Elettroforesi Capillare | | 90.38.4 | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | SODIO | S | € 0,85 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | ISE | mMol/L | 90.40.4 | 132 - 148 |
| NAU | SODIO URINE | S | € 0,85 | LuMaMeGiVe | 1 | 22 | ISE | mEq/24h | 90.40.4 | |
| NAUSP | SODIO URINE SPOT | N | € 0,85 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 56 | ISE | mEq/L | 90.40.4 | 30 - 120 |
| SOM | SOMATOMEDINA C (IGF-1) | N | € 28,00 | Me | 2 | 18 | CLIA | ng/mL | 90.40.7 | Adulti: 54,0 - 509,9<br>Bambini: 33,5 - 399,3 |
| SOR26 | SORDITA' CONGENITA CX26 | N | € 100,00 | LuMe | 12 | | PCR | | | Negativo |
| DRUCO | Sostanze d'abuso conferma GCMS | N | € 150,00 | LuMe | 12 | | GC MS | | | |
| SSDNA | STAPHYLOC. SAPROPHYTICUS DNA | N | € 48,00 | LuGi | 11 | | PCR | | | Negativo |
| MRSA | STAPHYLOCOCCUS AUREO MRSA | N | € 28,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 78 | Colturale | | | |
| STAPH | STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTIC DNA | N | € 48,00 | LuGi | 11 | | PCR | | | Negativo |
| 762 | STIRENE EMATICO | N | € 25,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | | | | | |
| XTSAG | STREPTOCOCCO BEGA SCREENING | S | € 0,00 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 3 | Immunocromatografico | | 90.93.5 | Negativo<br>Test specifico per l'antigene Strep-A dello streptococco BEGA. L'esito del test deve essere confermato mediante tecniche colturali. |
| AGALA | STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DNA | N | € 48,00 | LuGi | 11 | | PCR | | 90.83.4 | Negativo |
| PNEUR | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Ag | N | € 55,00 | LuMaMeGi | 5 | | Immunocromatografico | | | Negativo |
| 6198 | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Ag | N | € 46,00 | LuMaMeGi | 5 | | Immunocromatografico | | | Negativo |
| STRIS | STRISCIO EMATICO | N | € 5,00 | LuMaMeGiVe | 4 | 69 | Microscopia digitale | | | |
| 648 | SUPEROSSIDO DISMUTASI | N | € 60,00 | LuMaMeGiVe | 13 | | Spettrofotometria | U/mL | | 164 - 240 |
| T3 | T3 | N | € 13,00 | LuMaMeGiVe | 4 | 150 | CLIA | ng/mL | | 0,60 - 1,81 |
| T4 | T4 | N | € 13,00 | LuMaMeGiVe | 4 | 150 | CLIA | ug/dL | | 4,5 - 10,9 |
| 685 | TACROLIMUS (FK 506) | N | € 50,00 | LuMaMeGi | 14 | 50 | ACMIA | ng/mL | | 5 - 20 |
| TALA | TALASSEMIA ALFA (MLPA) | N | € 240,00 | MaGi | 13 | | MLPA | | | Negativo<br>Mutazioni investigate: -101 (C->T), IVS-I-5 (G->C), -92 (C->T), IVS-I-6 (T->C), -87 (C->A), IVS-I-110 (G->A), -87 (C->G), IVS-I-116 (T->G), Coddon 1 (-G); GTG(Val)->-TG, IVS-I-130 (G->C); TTAG'GCTG->TTAC GCTG, Codon 5 (-CT); CCT(Pro)->C--, C |
| TBGO | TB Gold QUANTIFERON | N | € 165,00 | LuMaMeGiVe | 21 | 162 | EIA | | | Negativo |
| TEE | TEMPO DI EMORRAGIA (DUKE) | N | € 8,00 | LuMaMeGiVe | 1 | | | s | 90.75.2 | Fino a 180 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEIVY | TEMPO DI EMORRAGIA (IVY) | N | € 15,00 | LuMaMeGiVe | 0 | | | s | 90.75.2 | Adulti: 300 - 420<br>Bambini: 300 - 800 |
| TP | TEMPO DI PROTROMBINA | S | € 2,30 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Coagulometrico | s | 90.75.4 | |
| TEO | TEOFILLINA | N | € 14,50 | LuMaMeGiVe | 5 | | EMIT | ug/mL | 90.41.2 | 10,0 - 20,0 |
| TCD | TEST DI COOMBS DIRETTO | S | € 16,15 | LuGi | 5 | 139 | Micro Typ. | | 90.58.2 | Negativo |
| TCI | TEST DI COOMBS INDIRETTO | S | € 8,35 | LuGi | 5 | 128 | Micro Typ. | | 90.49.3 | Negativo |
| FARLE | TEST DI FARLEY | N | € 10,00 | LuMaMeGiSa | 2 | 28 | Microscopia digitale | | 90.76.4 | |
| TGR | TEST DI GRAVIDANZA | N | € 2,05 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Immunocromatografico | | 90.27.3 | Negativo |
| SIA | TEST DI SIA | N | € 15,00 | LuMaMeGiVeSa | 3 | | Precipitazione | | | Negativo |
| TPF | TEST PRECIPITINE A FREDDO | N | € 10,00 | LuMaMeGiVeSa | 5 | | Agglutinazione | | | Negativo |
| TES | TESTOSTERONE | S | € 6,90 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA | ng/mL | 90.41.3 | Uomo: Adulti 2,70 - 9,80<br>Prepuberale 0,05 - 1,00<br>Donna: 0,05 - 1,00<br>Bambini: 0,05 - 1,00 |
| TEL | TESTOSTERONE LIBERO | N | € 13,90 | LuMe | 7 | 88 | EIA | pg/mL | 90.41.4 | Uomo: Fino a 39 anni 8,9 - 42,5<br>40 - 59 anni 6,6 - 30,0<br>Oltre i 60 anni 4,5 - 21,6<br>Donna: Prepuberi Fino a 4,1<br>In età fertile Fino a 4,1<br>Postmenopausa Fino a 2,0<br>Prepuberi Fino a 4,1<br>Bambini: Fino a 4,10 |
| TEU | TESTOSTERONE URINE SPOT | N | € 6,90 | LuMaMeGiVeSa | 13 | | CLIA | ng/24h | 90.41.3 | Uomo: 25 - 100<br>Donna: < 10<br>Bambini: < 10 |
| 398 | TIMIDINA CHINASI | N | € 80,00 | LuMaMeGi | 18 | | CLIA | U/L | | Fino a 7,5 |
| 6562 | TIOCIANOATO | N | € 18,00 | LuMaMeGiVe | 9 | | Potenziometrico | mg/L | | Soggetti normali 1,0 - 4,0<br>Fumatori 3,0 - 12,0<br>Range terapeutico 5,0 - 30,0<br>Tossico > 50,0 |
| TPMT | TIOPURINA METILTRANSFERASI | N | € 180,00 | LuMeVe | 15 | | PCR | | | |
| TIPLI | TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA | S | € 165,00 | LuMaMeGiVe | 4 | 61 | Citom. Fl. | | 90.81.5 | |
| HTG | TIREOGLOBULINA | S | € 13,35 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA 2° generazione | ng/mL | 90.41.5 | Fino a 54,0<br>Ablazione totale tiroide: < 1,0<br>Limite di rilevazione 0,1 ng/ml |
| TBG | TIROXIN BINDING GLOBULIN (TBG) | N | € 12,50 | LuGi | 9 | | CLIA | ug/mL | 90.26.2 | 13 - 39 |
| TAF | TITOLO ANTI-STAFILOLISINICO | N | € 15,00 | LuMe | 8 | | Agglutinazione | U/mL | | Fino a 2,0 |
| 6305 | TNF (TUMOR NECROSIS FACTOR) | N | € 80,00 | LuMaMeGi | 15 | | EIA | ng/L | | 4,6 - 12,4 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIR | TOPIRAMATO (TOPAMAX) | N | € 60,00 | LuMaMeGiVe | 9 | | HPLC | ug/mL | | 2,0 - 10,0 |
| TOXOP | TOXOPLASMA GONDII PCR | N | € 60,00 | MaGi | 6 | | PCR | | | Negativo<br>Il limite di rilevabilità della metodica è pari a 50 copie/ml. |
| TPA | TPA Ag Polipeptidico tissutale | N | € 18,50 | LuMaMeGiVe | 3 | 22 | CLIA | U/L | 90.56.4 | Fino a 75,0 |
| TPH | TPHA | N | € 18,00 | LuMeVe | 3 | 42 | Emoagglut. | Titolo | 91.10.B | < 1:80 |
| GOT | TRANSAMINASI GO (AST) | S | € 1,05 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Cinetico | U/L | 90.09.2 | Uomo: Fino a 38,0<br>Donna: Fino a 31,0<br>Bambini: Fino a 48,0 |
| GPT | TRANSAMINASI GP (ALT) | S | € 1,00 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Cinetico | U/L | 90.04.5 | Uomo: Fino a 40,0<br>Donna: Fino a 31,0<br>Bambini: Fino a 46,0 |
| TRFV | TRANSFERRINA | S | € 3,20 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | Turbidimetria | mg/dL | 90.42.5 | 170 - 340 |
| TRF | TRANSFERRINA | S | € 3,20 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | Turbidimetria | mg/dL | 90.42.5 | 170 - 340 |
| CDTH | TRANSFERRINA CARB. CAR. (CDT) | N | € 36,00 | LuMaMeGiVe | 8 | | HPLC | % | | < 2,10 |
| TRFIN | TRANSFERRINA INSATURA | N | € 1,70 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | Turbidimetria | ug/dL | 90.42.4 | 190 - 300 |
| TRAL2 | TRANSITO ORO-CECALE (CH4) | N | € 0,00 | LuMaMeGiVeSa | 14 | | Breath Test | | | |
| TRALE | TRANSITO ORO-CECALE (H2) | N | € 150,00 | LuMaMeGiVeSa | 14 | | Breath Test | | | |
| TRETA | TREPONEMA DNA TAMPONE | N | € 120,00 | LuMaMeGiVeSa | 9 | | PCR | | | Negativo |
| f433 | Tri a 14 Triticum aestivum | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 128 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| f416 | Tri a 19 Triticum aestivum | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 150 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| TRICH | TRICHOMONAS VAGINALIS DNA | N | € 48,00 | MaGi | 99 | | PCR | | | Negativo |
| TRI | TRIGLICERIDI | S | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 4 | Enzimatico Trinder | mg/dL | 90.43.2 | Adulti: Valori desiderabili Fino a 150<br>Bambini: Valori desiderabili Fino a 90 |
| TMAO | TRIMETILAMMINA N-OSSIDO | N | € 75,00 | LuMaMeGi | 28 | | EIA | uMol/L | | 2,35 - 5,79<br>Nella valutazione dell'indice di rischio:<br>Rischio basso < 6,20<br>Rischio medio 6,20 - 9,90<br>Rischio elevato > 10,00 |
| TRIP | TRIPTASI | N | € 85,00 | LuMaMeGiVe | 15 | 97 | FEIA | ug/L | | Fino a 11,4 |
| 490 | TRIPTOFANO | N | € 15,60 | LuMaMeGiVe | 17 | | HPLC | mU/mL | 90.18.5 | 4,3 - 29,0 |
| TTR | TRI-TEST | N | € 82,00 | LuGi | 7 | | CLIA | | 90.43.1 | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO | TROPONINA I ALTA SENSIBILITA' | N | € 8,15 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | CLIA 3° generazione | pg/mL | 90.82.3 | Uomo: Riferimento 99° percentile < 53,5<br>Dosaggio specifico isoforma cardiaca della Troponina I. La Troponina I può essere rilevata nel sangue a 4-8 ore dall'inizio del dolore con un picco a 14-36 ore. In presenza di dolore toracico si raccomanda<br>Donna: Riferimento 99° percentile < 34,0<br>Dosaggio specifico isoforma cardiaca della Troponina I. La Troponina I può essere rilevata nel sangue a 4-8 ore dall'inizio del dolore con un picco a 14-36 ore. In presenza di dolore toracico si raccomanda l<br>Bambini: Riferimento 99° percentile < 45,0<br>Dosaggio specifico isoforma cardiaca della Troponina I. La Troponina I può essere rilevata nel sangue a 4-8 ore dall'inizio del dolore con un picco a 14-36 ore. In presenza di dolore toracico si raccomanda l |
| TSH | TSH | S | € 4,75 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 6 | CLIA 3° generazione | mU/L | 90.42.1 | Adulti: > 20 anni 0,55 - 3,60<br>13 - 20 anni 0,48 - 5,40<br>Bambini: 0,480 - 5,400 |
| TSREF | TSH REFLEX | S | € 6,80 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 5 | CLIA | mU/L | 90.41.8 | Adulti: 0,350 - 3,600<br>Bambini: 0,450 - 5,400 |
| TUNEL | TUNEL TEST (LIQUIDO SEMINALE) | N | € 190,00 | MaGi | 28 | | TUNEL | % | | Uomo: Nella valutazione per ICSI:<br>Ottima fertilità Fino a 15<br>Discreta fertilità 15 - 40<br>Scarsa fertilità > 40 |
| UGT1N | UGT1A1 NGS (Crigler-Najjar) | N | € 590,00 | LuMaMeGiVe | 35 | | Next Generation Sequencing | | 90.64.3 | |
| UGTA1 | UGT1A1*28 Met. irinotecani | N | € 190,00 | LuMaMeGiVe | 17 | | PCR | | 90.64.3 | |
| BUN | UREA | S | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 5 | Ureasi UV | mg/dL | 90.44.1 | 10 - 50 |
| BUNPD | UREA POST DIALISI | S | € 1,10 | LuMaMeGiVeSa | 0 | | Ureasi UV | mg/dL | 90.44.1 | 10 - 50 |
| AZU | UREA URINE | S | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 2 | 24 | Ureasi UV | g/24h | 90.44.1 | |
| AZUSP | UREA URINE SPOT | N | € 1,10 | LuMaMeGiVe | 2 | 60 | Ureasi UV | g/L | 90.44.1 | 13 - 43 |
| 8270 | UREAPLASMA PARVUM DNA | N | € 95,00 | | 0 | | Realtime PCR | | | |
| UREAP | UREAPLASMA UREALITYCUM DNA | S | € 59,90 | MaGi | 0 | | PCR | | | Negativo |
| VARDN | VARICELLA ZOST. (HSV3) DNA | N | € 120,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Negativo |
| VDR | VDRL | N | € 16,00 | LuMeVe | 3 | 44 | Immunologico | | 91.10.B | Negativa |
| VE1 | Vera 1 T21 | N | € 250,00 | LuMaMeGiVe | 3 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VE10 | Vera 10 Cario Plus Omnia 500 | N | € 2700,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | Next Generation Sequencing | | | |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE2 | Vera 2 Prenatal 13,18,21 | N | € 350,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VE3 | Vera 3 Prenatal 13,18,21,X,Y | N | € 500,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VE4 | Vera 4 Prenatal Plus 10 Microd | N | € 650,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VE5 | Vera 5 Cario 21 Cromosomi | N | € 700,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VE6 | Vera 6 Cario Plus 10 Microdel. | N | € 850,00 | LuMaMeGiVe | 5 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VE8 | Vera 8 Cario Omnia (63 Patol.) | N | € 1300,00 | LuMaMeGiVe | 9 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VE9 | Vera 9 Cario Plus Omnia 340 P. | N | € 2300,00 | LuMaMeGiVe | 11 | | Next Generation Sequencing | | | |
| VES | VES | S | € 1,80 | LuMaMeGiVeSa | 0 | 4 | Westergren automatizzato | mMol/h | 90.82.5 | Fino a 15 |
| i211 | Ves v 1 Vespula vulgaris | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 219 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| i209 | Ves v 5 Vespula vulgaris | S | € 32,00 | LuMaMeGiVe | 5 | 219 | IMMUNOCAP | U/mL | | < 0,35 |
| VIA | VITAMINA A (RETINOLO) | N | € 13,75 | LuMaMeGi | 10 | 148 | HPLC | mg/L | 90.45.1 | 0,30 - 0,70 |
| VB1 | VITAMINA B1 (TIAMINA) | N | € 13,75 | LuMaMeGiVe | 12 | 143 | HPLC | ug/L | 90.45.1 | 28 - 85 |
| VIB | VITAMINA B12 (COBALAMINA) | S | € 6,90 | LuMaMeGiVeSa | 2 | 6 | CLIA | pg/mL | 90.13.5 | 211 - 946 |
| VB2 | VITAMINA B2 | N | € 13,75 | LuMe | 14 | 158 | HPLC | ng/mL | 90.45.1 | 137 - 370 |
| VB6 | VITAMINA B6 | N | € 13,75 | LuMaMeGiVe | 10 | 140 | HPLC | ug/L | 90.45.1 | Adulti: 3,6 - 18,0<br>Bambini: 2,0 - 15,0 |
| VITC | VITAMINA C (ASCORBATO) | N | € 13,75 | LuMaMeGi | 10 | 143 | HPLC | uMol/L | 90.45.1 | 26,1 - 84,6 |
| VITD1 | VITAMINA D 1,25 DIIDROSSI | N | € 14,90 | LuMaMeGiVe | 14 | 88 | CLIA | pg/mL | 90.44.5 | 15,2 - 90,0 |
| VIDT | VITAMINA D 25-OH | S | € 11,15 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 7 | CLIA | ng/mL | 90.44.6 | Valori desiderabili 30 - 50<br>Probabile carenza < 20<br>Grave carenza < 10<br>Probabile eccesso > 80<br><br>La metodica, di nuova generazione, valuta il colecalciferolo (25-OH Vitamina D3) e l'ergocalcife |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDTc | VITAMINA D 25-OH | S | € 13,75 | LuMaMeGiVeSa | 1 | | CLIA | ng/mL | 90.45.1 | Valori desiderabili 30 - 50<br>Probabile carenza < 20<br>Grave carenza < 10<br>Probabile eccesso > 80<br>La metodica, di nuova generazione, valuta il colecalciferolo (25-OH Vitamina D3) e l'ergocalcife |
| VIDTV | VITAMINA D 25-OH | S | € 11,15 | LuMaMeGiVeSa | 1 | 9 | CLIA | ng/mL | 90.44.5 | Valori desiderabili 30 - 50<br>Probabile carenza < 20<br>Grave carenza < 10<br>Probabile eccesso > 80<br>La metodica, di nuova generazione, valuta il colecalciferolo (25-OH Vitamina D3) e l'ergocalcife |
| VIE | VITAMINA E (TOCOFEROLO) | N | € 13,65 | LuMaMeGi | 10 | 174 | HPLC | mg/L | 90.45.2 | 5,0 - 20,0 |
| VITH | VITAMINA H (BIOTINA) | N | € 70,00 | LuMe | 22 | 177 | HPLC | mg/L | | > 100 |
| VK1 | VITAMINA K | N | € 13,75 | LuMaMeGiVe | 21 | | LC MSMS | ng/L | 90.45.1 | A digiuno 50 - 900<br>Post prandiale 50 - 1800 |
| VPP | VITAMINA PP (B3, NIACINA) | N | € 13,75 | LuMe | 28 | | LC MSMS | ug/L | 90.45.1 | 14,0 - 52,0 |
| VWFAT | VON WILLEBRAND FACT. ATTIVITA' | N | € 3,55 | LuMaMeGiVe | 21 | 119 | Immunometrico | % | 90.64.3 | 47,8 - 173,2 |
| VWF | VON WILLEBRAND FACTOR ANTIGENE | N | € 3,55 | LuMaMeGiVe | 21 | 119 | Immunoturbidimetrico | % | 90.64.3 | 50 - 160 |
| WR | WAALER-ROSE | N | € 9,30 | LuMaMeGiVe | 2 | 25 | Immunologico | | 90.74.2 | Negativa |
| FRAXA | X FRAGILE FRAXA | N | € 130,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Esame realizzato mediante amplificazione specifica del gene FMR1 al locus Xq27.3.<br>Studio delle ripetizioni CGG associate alla sindrome di Martin-Bell. Valutazione dei risultati mediante elettroforesi capillare con sequenziatore automatico. |
| FRAXE | X FRAGILE FRAXE | N | € 130,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Negativo |
| FRAX2 | X FRAGILE II LIVELLO CONFERMA | N | € 300,00 | LuGi | 9 | | PCR | | | Esame realizzato mediante amplificazione specifica del gene FMR1 al locus Xq27.3.<br>Studio delle ripetizioni CGG associate alla sindrome di Martin-Bell. Valutazione dei risultati mediante elettroforesi capillare con sequenziatore automatico. |
| XILU | XILENE URINE | N | € 60,00 | LuMe | 0 | | GC FID | | | |
| XILO | XILOSIO | N | € 50,00 | LuMe | 11 | | Enzimatico | mg/dL | | |
| ISA | z ISOENZIMI AMILASI | N | € 3,65 | LuMaMeGiVe | 7 | 82 | Chimico | U/L | 90.06.5 | |
| ZIN | ZINCO | N | € 6,50 | LuMaMeGiVe | 2 | 106 | Colorimetrico | ug/L | 90.45.4 | Adulti: 800 - 1600<br>Bambini: 600 - 1200 |
| ZIU | ZINCO URINE SPOT | N | € 6,50 | LuMe | 4 | 153 | ICP MS | uMol/L | 90.45.4 | 1,0 - 20,0 |
| ZPP | ZINCOPROTOPORFIRINA | N | € 23,50 | LuMaMeGi | 18 | | Fluorimetria | | | Popolazione generale < 2,5<br>Per i lavoratori professionalmente esposti si suggerisce l'allontanamento per valori > 12,0 |
| 1383 | ZONULINA | N | € 90,00 | LuMaMeGi | 28 | 185 | EIA | ng/mL | | Fino a 34,0 |

| Codice | Descrizione | In convenzione | Tariffa | Inizio Dosaggio | Giorni | TAT ore | Metodo | Unità | Cod. Nom. | Intervallo di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | ZONULINA FECALE | N | € 160,00 | LuMaMeGi | 13 | | EIA | | | 14,0 - 108,0 |